


မြည်တောင်မှမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်းရေးအဖွဲ့မှ ပညာရေးနှင့်
 ကျောင်းဆရာတော်တော်တော်

အခြေခံ ဘူမိဗေဒ အတွဲ-၂

အခြေခံပညာရေးအထက်တန်း



အခြေခံပညာရေးစနစ်သစ် အထက်တန်းများအတွက်

အခြေခံဘူမိဗေဒ

အတွဲ (၂)

ပြည်ထောင်စုပြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးအစိုးရ ပညာရေးဌာန
ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မီတီ

၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်သည်။
ပထမနှိပ်ခြင်း၊ အုပ်ရေ ၂၀၀၀၀

ထုတ်ဝေသူ- ကုန်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (စာအုပ်နှင့် စာရေးကရိယာ)
(မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၂၆၂) ၅၅၀/၅၅၂၊ ကုန်သည်လမ်း
ရန်ကုန်မြို့၊ ထုတ်ဝေသည်။

ပုံနှိပ်သူ - ဦးစိုးမြင့် (မန်နေဂျာ)၊ (၀၀၃၂) တက္ကသိုလ်များပုံနှိပ်တိုက်၊
စီးပွားရေး၊ တက္ကသိုလ် အဆောက်အဦ၊ တက္ကသိုလ် နယ်မြေ
ရန်ကုန်။

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

အခန်း ၆။ မတည်ငြိမ်သောကမ္ဘာမြေကြီး

၁

၁။ မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှုများ

၂

- (က) မြေငလျင်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှုဖြစ်ခြင်းများ
- (ခ) မြေငလျင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် မပတ်သက်သည့် မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှုများ
- (ဂ) မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှု၏ ဘူမိအထောက်အထားများ။

၂

၄

၅

၂။ လွှာတုန်ခြင်း

၈

- (က) လွှာတုန်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းများ
- (ခ) လွှာတုန်အမျိုးအစားများ

၈

၉

၃။ ပြတ်ရွေ့ခြင်း

၁၃

- (က) အခေါ်အဝေါ်များ
- (ခ) ပြတ်ရွေ့အမျိုးအစားများ

၁၃

၁၅

၄။ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်များ

၁၇

- (က) လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှုအမျိုးမျိုး
- (ခ) လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ခြင်း၏ အထောက်အထားများ
- (ဂ) လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှု၏ အရေးကြီးပုံများ

၁၈

၁၉

၂၀

၅။ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း

၂၀

- (က) မြေငလျင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ
- (ခ) ဆွဲဆန့်ကြိုးပဲ့ခြင်းအယူအဆ
- (ဂ) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ငလျင်လှုပ်ရာအပိုင်းကြီးများ
- (ဃ) ငလျင်လှိုင်းများ
- (င) မြေငလျင်တိုင်းကိရိယာ
- (စ) ငလျင်ဗဟိုရံချက် နှင့် ငလျင်မြေပြင်ဗဟိုရံချက်
- (ဆ) ဆိုးဝါးလှသော ငလျင်များအကြောင်းသမိုင်းအကျဉ်း
- (ဇ) မြန်မာပြည်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော မြေငလျင်များအကြောင်း အကျဉ်း

၂၁

၂၂

၂၄

၂၅

၂၇

၂၉

၃၀

၆။ တောင်တန်းကြီးများနှင့် တောင်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၃၃
(က) တောင်တန်းကြီးများတည်ရှိပုံ	၃၃
(ခ) တောင်အမျိုးမျိုးများ	၃၆
(ဂ) တွန့်ခေါက်တောင်တန်းများ	၃၆
(ဃ) တောင်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ	၃၇
၁။ အပူကျုံ့ခြင်းအယူအဆ	၃၉
၂။ လှည့်ပတ်စီးခြင်းအယူအဆ	၃၉
၃။ တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆ	၄၂

၇။ မီးတောင်များနှင့် မီးတောင်ဖြစ်မှု	၄၂
(က) အက်ကွဲကြောင်းနှင့် ဗဟိုပေါက်ကွဲမှုများ	၄၂
(ခ) မီးတောင်အမျိုးအစားများ	၄၃
(ဂ) ကမ္ဘာ့မီးတောင်များ ပေါများရာ အပိုင်းကြီးများ	၄၅
(ဃ) ယူဂေးမီးတောင်	၄၇

၈။ တိုက်ကြီးများရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆ	၄၈
(က) ကမ္ဘာဦးအစသမိုင်း	၄၈
(ခ) တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားမှု	၅၀
(ဂ) တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆအတွက် အထောက်အထားများ	၅၁

အခန်း ၇။ ချိန်တာ၊ ဇီဝနှင့် လူ ၅၅

၁။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ	၅၆
(က) ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်လိုအပ်သော အခြေအနေများ	၅၆
(ခ) ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံအမျိုးမျိုး	၅၆
(ဂ) ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ၏ အသုံးဝင်ပုံများ	၅၉
၂။ ဘူမိကျောက်လွှာခေတ်လံ(The Stratigraphic Column)	၆၀
၃။ သတ္တဝေလောကနှင့် ရုက္ခလောက	၆၃
(က) သက်ရှိများပြောင်းလဲတိုးတက်လာခြင်း(Evolution of Life)	၆၄
(ခ) ပရိုတိုဇိုးဝါး(Protozoa)	၆၅
(ဂ) စီလင်တရေတား (သန္တာကောင်များ-Corals)	၆၇

(ဃ) ဘရာချီယိုပိုးဒါး(Brachiopoda)	၆၉
(င) အာသရိုပိုးဒါး(Arthropoda)	၆၉
(စ) မိုလပ်စကား(Mollusca)	၇၂
(ဆ) အကွီနိုဒါမားတား(Echinodermata)	၇၅
(ဇ) ဂရက်တိုလိုက်များ(Graptolites)	၇၇
(ဈ) ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ(Vertebrata)	၇၇
(ည) သစ်ပင်များ	၈၂

၄။ လူနှင့် လူ၏ဖြစ်စဉ်သမိုင်း	၈၂
------------------------------	----

အခန်း (၈) ။ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ သယံဇာတ ပစ္စည်းများ	၈၆
--	----

၁။ စီးပွားဖြစ် တွင်းထွက်သိုက်များ	၈၆
-----------------------------------	----

(က) မီးသင့်ပြုသိုက်	၈၆
(ခ) ကျောက်ချေမှုခြင်းပြုသိုက်	၈၉
(ဂ) အနည်ကျခြင်းပြုသိုက်	၉၀
(ဃ) ကျောက်ဖြစ်မှုနှင့် ယှဉ်တွဲဖြစ်ပေါ်လာသော အဘိုးတန် ကျောက်ဝတ္ထုနှင့် တွင်းထွက်များ	၉၁

၂။ လောင်စာများ	၉၁
----------------	----

(က) ကျောက်မီးသွေး	၉၂
(ခ) ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့	၉၂
(ဂ) ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ	၉၂
(ဃ) အနုမြူဓာတ်အား	၉၄

အခန်း (၉) ။ မြန်မာပြည်၏ မြေအောက် သယံဇာတကြွယ်ဝမှုများ	၉၅
--	----

၁။ ငွေနှင့်ခဲ	၉၅
---------------	----

(က) ဘော်တွင်း သတ္တုတွင်း	၉၅
(ခ) ဘော်ဆိုင်းဒေသ	၉၈
(ဂ) ခဲထွက်ရာအခြားဒေသများနှင့် ခဲထွက်ရာအပိုင်းများ	၉၈

၂။ သံပြွန်နှင့် အဖိုက်နက်	၉၉
---------------------------	----

(က) သံပြွန်နှင့် အဖိုက်နက်ထွက်ရာ အပိုင်းများ	၉၉
(ခ) မော်ချီးသတ္တုတွင်း	၁၀၂

၃။ သံရိုင်းများ	၁၀၂
-----------------	-----

၄။ ခနောက်စိမ်း

၁၀၃

၅။ ကျောက်မျက်ရတနာများ

၁၀၄

(က) ပတ္တမြားနှင့်နီလာ

၁၀၄

(ခ) ကျောက်စိမ်း

၁၀၅

၆။ ကျောက်မီးသွေး

၁၀၆

(က) ကျောက်မီးသွေးထွက်ရာအပိုင်းများ

၁၀၆

(ခ) ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးတွင်းဒေသ

၁၀၇

(ဂ) လွယ်အံ့ ကျောက်မီးသွေးတွင်းဒေသ

၁၀၇

(ဃ) အခြားကျောက်မီးသွေးကြောများ

၁၀၈

၇။ ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့

၁၀၈

(က) ရေနံမြေသမိုင်းအကျဉ်း

၁၀၉

(ခ) ယနေ့ ရေနံတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၁၀

(ဂ) ဘူမိဗေဒ

၁၁၀

(ဃ) ဘူမိနေထားယူနစ်များ

၁၁၁

(င) ရေနံခိုအောင်းရာ သဲကြောများနှင့် ဘူမိနေထားများ

၁၁၁

အခန်း (၁၀)။ ကွင်းဆင်းဘူမိဗေဒ

၁၁၃

၁။ ကွင်းဆင်းရာတွင် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းကရိယာများ

၁၁၃

၂။ ကွင်းဆင်းရာတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အကြောင်းအရာများ

၁၁၄

၃။ မြေပုံများ

၁၁၆

(က) မြေပြင်ပြ မြေပုံ

၁၁၆

(ခ) ဘူမိဗေဒမြေပုံ

၁၁၆

(ဂ) ဘူမိဖြတ်ပိုင်းမြေပုံများ

၁၁၇

(ဃ) ဘူမိဗေဒမြေပုံတွင် အသုံးပြုသည့် ပုံစံအမှတ်အသားများ

၁၁၇

အခန်း (၁၁)။ အခြေခံ ဘူမိဗေဒ အယူအဆများ

၁၁၈

၁။ ဖြစ်ပျက်မှု တူညီခြင်းဟူသောအယူအဆ (ပစ္စုပ္ပန်သည်အတိတ်အတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်)

၁၁၉

၂။ ဘူမိဗေဒအချိန်ဟူသည့်အယူအဆ

၁၁၉

၃။ တည်မြဲမှုကင်းမဲ့ခြင်း

၁၂၀

၁၂၂

၈ ကား ချီး

အခြေခံ ဘူမိဗေဒအတွဲ (၂) သည်၊ အခြေခံ ဘူမိဗေဒအတွဲ (၁) ၏ အဆက်ပင် ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူသည် ယင်းအပိုင်းနှစ်ခုစလုံးကို ဖတ်မိမှသာလျှင် ဘူမိဗေဒ၏ အခြေခံသဘောတရားများကို သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် အခြေခံ ဘူမိဗေဒအတွဲ (၁) သည် အခြေခံပညာရေးအထက်တန်း (နဝမတန်း) အတွက်ရည်ရွယ်ထား၍ အတွဲ (၂) သည်အခြေခံပညာရေး အထက်တန်း (ဒဿမတန်း) အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဘူမိဗေဒ စာအုပ်တစ်ခုကိုဖတ်ရှုရာ၌ ပူးတွဲပါရှိသည့်ရေးဆွဲပုံများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများကိုစာသား နှင့်အတူတကွ ယှဉ်တွဲလေ့လာ ဖတ်ရှုရလျှင် ရေးသားထားသည့် အကြောင်းအရာကို ပိုမိုနားလည် လွယ်စေသည်။ ဘူမိဗေဒစာပေကို ရေးသားရာ၌ ပုံများသည် အရေးကြီးသည့်နေရာကပါဝင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံဘူမိဗေဒစာအုပ်တွင်လည်း ရေးဆွဲပုံများကို တတ်နိုင်သ၍ လိုလေသေးမရှိစေရန် အချိန်ယူ၍ အပင်ပန်းခံကာ ရေးဆွဲဖော်ပြထားလေသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဤအခြေခံ ဘူမိဗေဒစာအုပ် သည် နိုင်ငံခြားကျောင်းသုံးစာအုပ်များမှ ဘာသာပြန် ရေးသားထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဘာသာပြန်ဆိုရာ၌ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲကိုသာ အသုံးမပြုဘဲ၊ စာအုပ်အနည်းဆုံး လေးအုပ်တို့မှ ကောင်းနိုးရာရာများကို ထုတ်ယူ၍၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာကျောင်းသားများနှင့် ဟပ်မိစေရန် ပြုစုရေးသား ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် ရေးသားဖော်ပြချက်တို့မှာ အများအားဖြင့် ပြည်တွင်း၌ထုတ်ဝေရိုက်နှိပ်သည့် စာအုပ်စာတမ်းတို့မှ မှီငြမ်းဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။

အခြေခံဘူမိဗေဒအတွဲ (၂) အားဘာသာပြန်ပြုစုရေးသားရာ၌မှီငြမ်းထားသောအဓိကစာအုပ်များမှာ (၁) Beginning Geology by Read & Watson. (၂) Physical Geology, Third Edition, by Leet & Judson. (၃) Principles of Geology, Second Edition, by Gilluly, Waters and Woodford. (၄) Geology: Principles and Processes, Fifth Edition by Emmons, Allison, Stauffer & Thiel တို့ ဖြစ်ကြသည်။

မတည်ငြိမ်သော ကမ္ဘာမြေကြီး

ကမ္ဘာမြေကြီး၏ မြေသားနှင့် ကျောက်သားများကို ကမ္ဘာ၏မြင့်ရာ တောင်တန်းဒေသများမှ ချောင်းများ၊ မြစ်များ၊ ရေခဲမြစ် သီးနှင်းနှင့် လေအဟုန်အသီးသီးတို့သည် ချေဖျက်၊ တိုက်စားသယ်ဆောင်လာကြပြီးလျှင်၊ မြေနိမ့်ရာ အင်းအိုင်နှင့် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတို့တွင် ပို့ချ အနည်ထိုင်စေလေသည်။ ဤကဲ့သို့သော ချေဖျက်တိုက်စားခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ပို့ချ အနည်ထိုင်ခြင်းဟူသော ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင် သဘာဝလုပ်ငန်းရပ်များသည် စက္ကန့်နာရီမခြား၊ မရပ်မနားတန်း၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ထောင်သောင်းများစွာသော နှစ်များတွင်သာမက၊ နှစ်ပေါင်းသန်းနှင့်ချီ၍ ပြုလုပ်နေသည်ဖြစ်ရာ၊ ကမ္ဘာ့တောင်တန်းကြီးများသည်၊ တဖြည်းဖြည်း နိမ့်နိမ့်ဆင်းလာကြပြီးလျှင်၊ တနေ့သောအခါ၌၊ တောင်တန်းများ၏ ကျောက်များအားလုံးသည်၊ တိုက်စားသယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရကာ၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ရာ၊ တောင်တန်းများ၏ အမြင့်သည်လည်း မြေမျက်နှာပြင်အထိ နိမ့်ဆင်းလာကာ၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများ၏ အနက်သည်လည်း ကျောက်နည်များ ပို့ချခြင်းခံရသောကြောင့် တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကောလာမည်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတနေ့၌ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာကြီးသည် ပြားပြားဝပ်မျှ ညီညာနေပြီ။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများသည်လည်း အားလုံးခန်းခြောက် သွားမည် မဖြစ်သည့်တိုင်အောင်၊ ပင်လယ်ရေတိမ်များ အဖြစ်ဖြင့်သာ တည်ရှိ ကျန်ရစ်ခဲ့မည် ဖြစ်လေတော့သည်။

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်မည်သာဆိုလျှင်၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ သဘာဝ အခြေအနေနှင့် ရာသီဥတုတို့သည် ယခုခေတ်နှင့်မတူတော့ဘဲ လွန်ကဲစွာ ကွာခြားသွားကာ၊ ကမ္ဘာမြေကြီးသည် သက်ရှိသစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် လူသားများအဖို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် မသင့်တော်တော့သည့်နေရာကြီးပင် ဖြစ်သွားကွယ်ရာ ရှိလေတော့သည်။

အမှန်အတိုင်းသာဆိုလျှင်၊ ကမ္ဘာကြီးသည် အထက်ကကဲ့သို့ တွေးထင်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကမ္ဘာကြီးသည် တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အစဉ်သဖြင့်သာလျှင် လှုပ်ရှားနေသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ ကမ္ဘာကြီး၏ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တောင်တန်းကြီးများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းကြီးများ၊ ကုန်းပြင်မြင့်များ စသည်တို့ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ကြပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာပင်လယ် အောက်ခြေပြင် တို့သည်လည်း နိမ့်ကြကာ၊ ပင်လယ်ရေခမ်းခြောက်မည့် အခြေအနေများကိုကာကွယ်ခဲ့ကြလေသည်။

တောင်တန်းများ နိမ့်ကြသွားလျှင်၊ ထိုနိမ့်ကြသော နေရာတွင်သော်၎င်း၊ တခြားနေရာများတွင်သော်၎င်း၊ တခြားတောင်တန်းများသည် အသစ်တဖန် ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိသည်။

ထိုကဲ့သို့ပင်၊ ပို့ချနည်းများကြောင့် ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းသည် တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကောလာလျှင် ကမ္ဘာ့လှုပ်ရှားမှုသဘာဝ တမျိုးမျိုးကြောင့် ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်း အောက်ခြေသည်၊ တိမ်ကောလာသည်နှင့်အမျှ ထပ်မံနိမ့်ကြလေ့ ရှိလေသည်။

ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့မြေပြင်မှ မြင့်မားသည့် တောင်တန်းကုန်းမြေများသည် မည်သည့်အခါမှ ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုနည်းတူစွာပင် ပင်လယ် ချိုင့်ဝှမ်းနှင့် သမုဒ္ဒရာတို့ သည်လည်း မည်သည့်အခါမှ ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်မှ ခမ်းခြောက်ကွယ်ပျောက်သွားမည် မဟုတ်ပေ။ ဖော်ပြပါအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကား၊ သဘာဝအလျောက် တည်ငြိမ်ခြင်း ကင်းမဲ့သော ကမ္ဘာကြီးကြောင့်ပင် တည်း။

ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့် တောင်တန်းများရှိ ထုံးကျောက်များ၌ တခါက ပင်လယ်တွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့သည့် ခရုနှင့် သန္တာကောင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို တွေ့ရလေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် အမြင့်ပေပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်မြင့်သည့် ဟိမဝန္တာတောင်ထိပ်များပေါ်မှလည်းအလားတူ ပင်လယ်တွင်း၌ အခြေခံသည့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို တွေ့ရလေသည်။ ဤအချက်များသည်၊ ကမ္ဘာ၏ ကုန်းမြေနှင့် ပင်လယ်တို့သည် အတည်တကျ မရှိကြဘဲ၊ လွန်ခဲ့သည့် ဘူမိခေတ်များ အတွင်းတွင် တချို့နေရာ၌ ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှ ယခုခေတ် တောင်ကုန်းကြီးများ အသွင် ထိုးတက်လာ၍ တချို့နေရာများ၌ မြေနိမ့်ကြခြင်းတို့ ရှိကြသည်ကို သက်သေပြလျက် ရှိလေသည်။


ဤနေရာ၌ မေးစရာအချက်တခု ရှိပါသည်။ ထိုအချက်မှာ ပင်လယ်တွင်းဖြစ် အနည်ကျကျောက်များသည်၊ မြင့်မားသည့်တောင်တန်းကြီးများအဖြစ်သို့ ရုပ်ချင်းမြင့်တက်လာပြီး၊ တချို့ကုန်းမြင့်များသည်၊ နက်ရှိုင်းသောချိုင့်ဝှမ်းကြီးများအဖြစ် ကမ္ဘာ့လှုပ်ရှားမှုတခုတည်းကြောင့် တမဟုတ်ချင်း နိမ့်ဆင်းသွားလေသလောဟူသော မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ ကမ္ဘာ့လှုပ်ရှားမှု တခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ တချိန်လျှင်လက်မအနည်းငယ်သော်၎င်း၊ ပေအနည်းငယ်သော်၎င်းရွေ့ရှားမှုကို ဖန်တည်းပေးသည့်လှုပ်ရှားမှုပေါင်း အကြိမ်ကြိမ်များစွာတို့သည် နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာထပ်ခါတလဲလဲ လှုပ်ရှားနေမှုကြောင့်သာ ဖြစ်လေသည်။

၁။ မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှုများ

(က) မြေလျှင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှုဖြစ်ခြင်းများ

ကမ္ဘာကြီး၏တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့မှုကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်၌အသိသာဆုံးလှုပ်ရှားမှုမှာ မြေလျှင်လှုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် မပြင်းထန်သော မြေလျှင်လှုပ် ရှားမှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့မြေကြီး၏ ကျောက်လွှာ များသည် ပြတ်ရွေ့ခြင်းနှင့် မြင့်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် နိမ့်ကြခြင်းတို့ မရှိပေ။ သို့သော်လည်း ပြင်းလန်လှသောလျှင်မြေကြီးလှုပ်ရှားမှုများတွင် သက်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ကျောက်မြေလွှာတို့သည် တုန်ခါလှုပ်ရှားရုံမျှသာမက ကျောက်မြေလွှာတို့သည်၊ အထပ်လိုက်ကန့်လန့်သော်၎င်း၊ လိုက်သော်၎င်း၊ အလျားလိုက်သော်၎င်း၊ ပြတ်ရွေ့ကာ၊ ပြတ်ရွေ့ကြောင်း၏တဖက်၌ရှိသော ထောင်လွှာတို့သည် မြင့်တက်လာ၍၊ အခြားတဖက်တွင်ရှိသော ကျောက်လွှာတို့သည် နိမ့်ကြသွားလေသည်။

ပြတ်ရွှေမျှားအကြောင်းကို ဤအခန်း၏အပိုင်း (၃) တွင် ပိုမိုရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ မြေလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပြတ်ရွှေကြောင်းများ၏ တဖက်ချက်တွင်ရှိသော ကျောက်လွှာများ၏မြင့်တက်၊ နိမ့်ကျမှုသည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အများအားဖြင့် ပေအနည်းငယ်မျှထောက်ပင်ရှိတတ်သည်။ တချို့လှုပ်ရှားမှုသည် မတ်စောက်သော ချောက်ကမ္ဘားလေးမျှ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည့် ထောင်လိုက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ တချို့လှုပ်ရှားမှုတွင် ထောင်လိုက်အပြင်၊ အလျားလိုက်လှုပ်ရှားမှုပါ ပါဝင်အကြီးဝင်နေပေသည် (ပုံ ၁)။



ပုံ ၁။ ။ဂျပန်ပြည်၊ ဆီနို-အိုဝါရီမြေလျှင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ချောက်ကမ္ဘားပုံ။ ပြတ်ရွှေပြီး နိမ့်ကြသွားသည့် မော်တော်ကားလမ်းကို တိုင်းတာချက်အရ၊ ထောင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် မြေပြင်ရွှေ့ရှားမှုများသည် ၂၀ နှင့် ၁၃ ပေ အသီးသီးရှိကြောင်း သိရသည်။

ဇယား ၁ တွင် ကမ္ဘာ့သမိုင်း၌ ထင်ရှားသည့်မြေလျှင်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြီးဆုံးသောပြတ်ရွှေ၊ မြင့်တက်၊ နိမ့်ကြ၊ ရွှေ့လျားပုံများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

ဒေသ	ခုနှစ်	အများဆုံးထောင်လိုက် ရွှေ့ရှားမှုပေ	အများဆုံးအလျားလိုက် ရွှေ့ရှားမှုပေ
အာသံနယ်၊ အိန္ဒိယပြည်	၁၈၉၇	၃၅	၀
အိုဝင်ချိုင့်ဝှမ်း၊ ကာလီဖိုးနီးယား	၁၈၇၂	၂၃	၁၂
မီနို-အိုဝါရီ၊ ဂျပန်	၁၈၉၁	၂၀	၁၃
စံပရန်စစ်စကို၊ ကာလီဖိုးနီးယား	၁၉၀၆	၃	၂၁
ဆိုနီးဗား၊ မက္ကဆီကို	၁၈၈၇	၂၀	၀
ပလဲဆင့်ချိုင့်ဝှမ်း၊ နီပားဝါး	၁၉၁၅	၁၆	၀

ဇယား ၁။ ။သမိုင်းဝင်မြေလျှင်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြင်သာသည့်ပြတ်ရွှေ၊ ရွှေ့ရှားမှုများ။

(ခ) မြေလျှင် လှုပ်ရှားမှုနှင့် မပတ်သက်သည့် မြေပြင် နိမ့်မြင့်မှုများ

မြေလျှင် လှုပ်ရှားမှုနှင့် မပတ်သက်သည့် မြေပြင် နိမ့်မြင့်မှုများသည်၊ မြေလျှင် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် မြေပြင် နိမ့်မြင့်မှုများလောက် မပေါများခြေ။ သို့သော်လည်း ယင်း မြေပြင် နိမ့်မြင့်မှုများသည် ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်တွင် အတော်လေး ပျံ့နှံ့နေလေသည်။ ဤကဲ့သို့ မြေပြင် နိမ့်မြင့်မှုများ၏ နှုန်းသည် အလွန်နှေးသော်လည်း၊ ယင်းတို့ကို တချို့ ဒေသများတွင် တိုင်းထွာနိုင်လေသည်။

အထက်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍၊ အထင်ရှားဆုံးသော သက်သေသားကမ္ဘာသည် နေပဲ (လ်) (Naples) ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိသည့် ရောမ ယဉ်ကျေးမှု၏ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်သည့် ဂျူပီတာရာပစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ ကျောက်တိုင်များပင်ဖြစ်သည်။ နဂိုမူလ အဆောက်အဦး၏ အစိတ်အပိုင်းများ အနေဖြင့် ကျောက်တိုင်ကြီး သုံးခုနှင့် ကျောက်ခင်း အောက်ခြေတပိုင်းတစ်ခုသာလျှင် ကြွင်းလျက် ကျန်ရှိလေရာ၊ ယင်းအောက်ခြေမှ ကျောက်တိုင်များ၏ အမြင့်ပေ ၁၈ ပေအထိ ကျောက်တိုင်များ၏ မျက်နှာပြင်သည်၊ ပင်လယ် ဂုံးကောင်များ၏ ဖောက်ထွင်းရာ ချိုင့်ခွက်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပြီး၊ ကြမ်းတမ်းသည့်အသွင်ကို ဆောင်နေလေသည်။



ပုံ ၂။ ။ အီတလီပြည်ရှိ ဂျူပီတာရာပစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ ကျောက်တိုင်များ။ မြေပြင်မှ ၁၈-ပေအထိ ကျောက်တိုင်များ၏ မျက်နှာပြင်သည် ပင်လယ် ဂုံးကောင်များ၏ ဖောက်ထွင်းရာများဖြင့် ကြမ်းတမ်းနေသည်။

(ပုံ - ၂) ။ ယင်းချိုင့်ခွက်များထဲတွင် ဂုံးခွန်များကို ယခုထက်တိုင် တွေ့နိုင်သေးသည်။ ၁၈ ပေ အထက်ပိုင်းကြသည့် ကျောက်တိုင်များ၏ မျက်နှာပြင်သည်၊ နဂိုပကတိအတိုင်းလိုလိုပင် ချောမွတ်လျက်၊ မပျက်မစီးဘဲ တွေ့နေရသည်။ ယင်းအချင်းအရာကိုထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အဆောက်အဦးသည် ဦးစွာပထမ၌ ခြောက်သွေ့သည့် ကုန်းပြင်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ဟန်တူသည်။

ထိုနောက်မှ၊ မြေတွင်း နိမ့်ကြလှုပ်ရှားမှုကြောင့်၊ ကျောက်ခင်းအောက်ခြေသည် ၁၈ ပေအထိ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အောက်သို့ နိမ့်ကြသွားခဲ့ပေရာ၊ ကျောက်တိုင်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်၌ ပင်လယ်ကုံး ကောင်များ၏ နေထိုင်တယ်ကပ် ထိုးဖောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေသည်။ ယင်းအခြေအနေမှ တဖန် ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း ဒေသပတ်ဝန်းကျင်၌ နောက်ထပ် မြေတွင်းမြင့်တက် လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ပင်လယ် မြေပြင်သည် ကုန်းမြေအဖြစ် တဖန် မြင့်တက်လာသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မြင့်တက်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

ဆွီဒင်နှင့် ဖင်လန်တိုင်းပြည်တွင်ရှိ ဘော (လ်) တစ် ပင်လယ်ကမ်းခြေ တလျှောက်တွင်လည်း ထူးခြားစွာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ပြောင်းလဲမှုရှိကြောင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်းဖြင့် သိရလေသည်။ ယခုအခါ ပင်လယ်ကမ်းခြေနားရှိ စိုက်ပျိုးခင်းများနှင့် ရေချိုရွံ့ညံ့များတွင် မျက်မှောက်ခေတ် ဘော (လ်) တစ် ပင်လယ်တွင်း၌ တွေ့ရှိရတတ်သည့် ပင်လယ်ခရု မျိုးစုံတို့ကို ထူးခြားစွာ တွေ့ရှိရလေသည်။ ယင်းအကြောင်းအရာကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကုန်းမြေသည် ပင်လယ်အခြေအနေမှ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ အတွင်းမှစတင်၍ တဖြေးဖြေး မြင့်တက် လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု တွက်ချက်နိုင်လေသည်။ ဤကဲ့သို့သော မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှု များသည် ယနေ့ထက်တိုင်အောင်ပင် ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်နေမည် မဖြစ်နေမည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန် ကျောက်တိုင်များကို ပင်လယ်ကမ်းခြေ၏ ဒီရေအမြင့်ဆုံးတက်သည့် အမှတ်မျဉ်းတလျှောက်တွင် စိုက်ထူခဲ့လေရာ၊ ယခုအခါယင်းကျောက်တိုင်ခပ်များများသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေ အနည်းငယ် မြင့်သည့်နေရာ၌တည်ရှိနေပြီး၊ တချို့သောကျောက်တိုင်များသည် ကုန်းမြေတွင်းတမိုင် မျှသောအကွာအဝေးတွင် ချောက်ရှိတည်ရှိနေကြောင်းကို တွေ့ရလေသည်။ ထို့ကြောင့်မြောက်ပိုင်း ဘော (လ်) တစ်ပင်လယ်အောက်ခြေ၏ မြေပြင်မြင့်တက်နှုန်းသည် နှစ်ပေါင်းတရာလျှင် ၃ ပေမှ ၄ ပေ အထိဖြစ်ကြောင်းကိုသိရသည်။ တချို့စကင်ဒီနေးဗီးယားဒေသများဘက်ရှိ ဘော (လ်) တစ်ပင်လယ် ကမ်းခြေတွင်မူ၊ မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှုအနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ် လုံးဝမရှိကြောင်းကို တွေ့ရလေသည်။ ဒိန်းမတ်ပြည်၏ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွင်မူ နှစ်ပေါင်းတရာလျှင် ၂ ပေမျှ မြေပြင်နိမ့်ကြမှုရှိသည်ကို တွေ့ရလေသည်။

(ဂ) မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှု၏ ဘူမိအထောက်အထားများ


မြေပြင်နိမ့်မှု၏ ဘူမိအထောက်အထားများကို အင်ဒိုနီးရှားပြည်၏ ဆူမတြာနှင့် ဂျာဗားကျွန်း များ၏မြောက်ပိုင်းဒေသများနှင့်မိုလု (စ)ကပ် (စ) (Mollusca) တောင်ပိုင်းဒေသများတွင်ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းအပူပိုင်းဇုံကျွန်းများတွင် များသောအားဖြင့် သန္တာကျောက် တန်းတို့ (coral reefs) သည်ဝန်းရံလျက်ရှိကြသည် (ပုံ ၃) ။ ယင်းသန္တာကျောက်တန်းများသည် သာမန်အားဖြင့် ထိပ်ပိုင်းပြားသည့်သဏ္ဌာန်ရှိပြီး ရေအောက်၌မြုပ်နေလေ့ရှိသော်လည်း၊ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အောက် ပေပေါင်း ၁၅၀ ထက်တိမ်သည့် အနက်တွင်သာ တည်ရှိကြသည်။ သန္တာ ကျောက်တန်းကို ဖြစ်မြောက်အောင် တည်ဆောက်ကြသည့် သန္တာကောင် သတ္တဝါကလေးများ၏

သဘာဝမှာ ပင်လယ်ရေအနက် ပေ ၁၅၀ အတွင်း၌သာ အောင်မြင်များပြားစွာ ပြန့်ပွားနိုင်ကြ သော်လည်း ပေ ၂၀၀ အနက်ထက် ပိုမိုနက်သည့် ရေတွင်သော်၎င်း၊ ပင်လယ်ရေနှင့်ကင်းကွာသည့် နေရာတွင်၎င်း အသက်ရှင်ဖြစ်သွန်းနိုင်ခြင်းမရှိပေ။



ပုံ ၃။ သန္တာကျောက်တန်းတစ်ခုကြမ်း


ယခုအခါအထက်ဖော်ပြပါ သန္တာကျောက်တန်းများပေါ်များသည့် ကျွန်းငယ်ကလေးများ တွင် အဆင့်ဆင့်မြင့် တက်နေသည့်သန္တာ ကျောက်တန်းများကို တွေ့ရလေသည် (ပုံ ၄)။ ယင်း အချင်းအရာသည် ကုန်းမြေတဖြေးဖြေးမြင့်တက်လာပြီး ပင်လယ်အောက်ခြေသည် တဆင့်ပြီးတဆင့် နိမ့်ကြသွားသည့်အကြောင်းအရာကို သက်သေခံလျက်ရှိနေပေသည်။



ပုံ-၄။ ။မိုလု (စ) ကပ် (စ) တောင်ပိုင်းရှိ ကစ္စကျွန်း၏ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်တက်လာသည့် သန္တာကျောက်တန်းများ

ကုန်းမြေ မြင့်တက်မှုကဲ့သို့ပင်၊ ကုန်းမြေနိမ့်ကြမှု၏ အထောက်အထားများကိုလည်း အထက် ဖော်ပြပါ ဒေသများ၌ တွေ့ရလေသည် (ပုံ-၅)။ ဆူမာတြာကျားဗားနှင့် ဘော်နီယိုကျွန်းများ အကြားရှိ ပင်လယ်ရေတိမ်၏ ရေအောက်ခြေ ပြင်ကို ဘူမိဗေဒ နည်းများဖြင့် စူးစမ်းလေ့လာ

တိုင်းတာသည့်အခါ၊ ယင်းပင်လယ်ရေတိမ်သည် တချိန်က အထက်ဖော်ပြပါ ကျွန်းကြီးများ၏ တဆက်တည်းဖြစ်သည့် ကုန်းမြေဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းကုန်းမြေတွင် ယခုကျွန်းကြီးများတွင် စီးဆင်းနေသည့် မြစ်များနှင့် တပြင်တကြောတည်း ဖြစ်သည့်မြစ်များသည် စီးဆင်းတည်ရှိခဲ့သည်ဟု သိရှိရလေသည်။ ပင်လယ်ရေတိမ် အောက်ခြေရှိ ကျောက်မြေနုပုဒ်များကိုလူပြီး စမ်းသပ် ဓာတ်ခွဲလေ့လာခြင်းအားဖြင့် လည်း ယင်းကျောက်မြေများသည်၊ တခါက ကုန်းမြေတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် နံးမြေ၊ မြစ်ရေလှုံ နံးမြေနှင့် သစ်ပင် အကြွင်းအကျန်များဖြစ်သည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုခေတ်ရှိ ယင်း ပင်လယ်ရေတိမ်သည်၊ ရှေးဘူမိခေတ်များအတွင်း၌ ကုန်းမြေဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ မြေပြင် လှုပ်ရှားနိမ့်ကြမှု ကြောင့်သာ ယခုလို ပင်လယ်ရေတိမ်အဖြစ် နိမ့်ကြသွားသည်ဟု သိရလေသည်။



ပုံ - ၅။ ။ ဘော်နီယို၊ ဆူမတြာနှင့် ဂျာဗားကျွန်းကြီး များ၏ မြစ်များနှင့် ယင်းမြစ်များ၏ ပင်လယ်ရေအောက် မြုပ်နေသည့် အစိတ် အပိုင်းများ။

မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်မြေပြင်နိမ့်မြင့်မှု များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းများ၏ ဘူမိ သက်သေ အထောက်အထား နောက်ထပ်တခုကို ပြရလျှင် ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၂၀ နား ဒေသရှိ လှော်ကားကန် အနောက်ဘက် ကမ်းခြေတွင်ပေါ်ထွက်နေသည့်သဲကျောက် များကို ဖော်ပြနိုင်ပေမည်။ အဆိုပါ သဲ ကျောက်များတွင် သေချာစွာ ရှာဖွေလျှင်၊ တချိန်က ပင်လယ်တွင်း၌နေထိုင်သွားလာ၊ ကျက်စားခဲ့သည့်၊ ခရု၊ ဂုံးခွန်များ နှင့် တိကောင်တို့၏ ကျင်းများကို တွေ့ရပေ မည်။ အဆိုပါ သတ္တဝါများကို ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်း ပညာနည်းများဖြင့် လေ့လာသည့် အခါ၊ ယင်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် သန်း ပေါင်း လေးဆယ်ကျော်က အသက်ရှင် နေထိုင်ခဲ့သည့် သတ္တဝါများဖြစ်သည်ဟု ခန့်


မှန်းနိုင်လေသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် သန်းလေးဆယ်ခန့် ကြာခဲ့သည့်အချိန်တွင် လှော်ကားဒေသ ပတ်ဝန်း ကျင်သည်၊ ပင်လယ်အောက်တွင် ကြရောက်နေပြီး ယခုမှသာ မြေပြင်မြင့်တက် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပင်လယ်နှင့် မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသည့် ကုန်းမြေတွင်းထဲ၌ တည်ရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု တွက်ချက်၍ ရလေသည်။

မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုအဖုံဖုံတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟူသော တခြားဘူမိအထောက်အထားများသည် လည်း များစွာရှိကြလေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးသော သက်သေခံချက်များမှာ၊ တွန့်ခေါက် တောင်တန်းများ၊ ပြတ်ရွှေ့ကြီးများနှင့် လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်များ စသည်တို့ဖြစ်လေသည်။

၂။ လွှာတုန်ခြင်း

ကမ္ဘာမြေကြီး၏ တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့စွာ လှုပ်ရှားမှုတို့ကြောင့် ကျောက်လွှာများသည် အထားနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးသို့ ပြောင်းလဲလာကြရာတွင် လွှာတုန်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည့် ကျောက်လွှာနေထားပြောင်းလဲမှု တရပ်ပင်ဖြစ်သည်။

လွှာတုန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ၊ ကျောက်လွှာများသည် မြေတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ဘေးတုန်းအား (lateral pressure) များကြောင့် ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့သော ကွေးညွတ်နိုင်သည့် အခြေသို့ ပြောင်းလဲကွေးကောက် တုန်ခေါက်လာပြီး၊ တုန်ခေါက်တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည် (ပုံ-၆)။




ပုံ-၆။ ။အပေါ်ပုံတွင်၊ ရေပြင်နှင့် ပြိုင်နေသည့် ကျောက်လွှာများကို ပြထားသည်။ အောက်ပုံတွင် ဘေးတုန်းအားတို့ကြောင့် တုန်ခေါက်လာသည့် ကျောက်လွှာများကို ပြထားသည်။ အောက်ပုံ၏ က-ခ အကွာအဝေးသည် အပေါ်ပုံ က-ခ အကွာအဝေး၏ နှစ်ပုံ သုံးပုံသာ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မြေပြင်ကြွခြင်းမှာ သုံးပုံတပုံ ဖြစ်သည်။

ဤကဲ့သို့ တုန်ခေါက်လာသည့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တွင် ခုံးတက်လာသည့်အနေအထားကို လွှာတုန်ခုံး (anticline) ဟု ခေါ်၍၊ ချိုင့်သွားသည့်သဏ္ဌာန်ကို လွှာတုန်ချိုင့် (syncline) ဟု ခေါ်သည်။

(က) လွှာတုန်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းများ

သာမန်အားဖြင့် လွှာတုန်ခုံးတခုသည် လှည်းပေါင်းကူးသဏ္ဌာန်ရှိ၍၊ လွှာတုန်ချိုင့်သည် အဆိုပါပေါင်းကူးအား ပြောင်းပြန်လှန်ထားသည့် ပုံနှင့် တူညီလေသည်။ လွှာတုန်မှု၏ ခုံးကြောတည့်တည့်တလျှောက်အတိုင်း တန်းဆွဲထားသည့် မျဉ်းကြောင်းကို ဝင်ရိုး (axis) ဟု ခေါ်သည် (ပုံ-၇)။

လွှာတန်း၏လှလုံးလိုက် အလယ်တည့်တည့်မှ အချိုးကိုက်ညီစွာ ဆွဲထားသည့် ဖြတ်ဆွဲပြင်ကို ဝင်ရိုးပြင် (axial plane) ဟု ခေါ်သည်။ ဝင်ရိုးပြင်၏ တဘက်တချက်တွင် ရှိကြသည့် လွှာတန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို လွှာတန်းခြမ်း (limb) ဟု ခေါ်တွင်သည်။




ပုံ-၇။ လွှာတန်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းများ။ (က) သာမန်လွှာတန်း (ခ) စိုက်ဝင်လွှာတန်း


(ခ) လွှာတန်းအမျိုးအစားများ

အချက်အချာဖြစ်သည့် လွှာတန်းမျိုးများမှာ၊ လွှာတန်းခုံး၊ လွှာတန်းချိုင့်၊ တဘက်ခုံးလွှာတန်း (monocline)၊ ကျောက်လွှာလိပ်ခုံး (dome) နှင့် ကျောက်လွှာချိုင့်ဝှမ်း (basin) များ ဖြစ်ကြသည်။


သာမန်အားဖြင့် လွှာတန်းများ၏ ဝင်ရိုးသည် ရေပြင်ဖြင့်ပြိုင်လျက်ရှိရာ၊ ယင်းကဲ့သို့သော ဝင်ရိုးရှိသည့်လွှာတန်းမျိုးကို သာမန်လွှာတန်း (normal fold) ဟု ခေါ်သည် (ပုံ ၇-က)။ သာမန်လွှာတန်း၏ ဝင်ရိုးသည် ရေပြင်နှင့်အပြိုင်ရှိနေသောကြောင့် ဝင်ရိုးပြင်၏အပေါ်မျဉ်းကြောင်းနှင့်လည်း တထပ်တည်း ဖြစ်နေပေသည်။ တချို့လွှာတန်းများ၌ ဝင်ရိုးသည် မြေကြီးထဲသို့ စိုက်ဝင်လျက်ရှိရာ၊ ယင်းကဲ့သို့သော ဝင်ရိုးရှိသည့် လွှာတန်းမျိုးကို စိုက်ဝင်လွှာတန်း (plunging fold) (ပုံ ၇-ခ) ဟု ခေါ်တွင်သည်။ စိုက်ဝင်ဝင်ရိုးသည်၊ ဝင်ရိုးပြင်၏ အပေါ်မျဉ်းကြောင်းနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ တည်နေခြင်းမရှိပေ။ ယင်းဝင်ရိုးပြင်၏ အပေါ်မျဉ်းကြောင်း (ရေပြင်ပြိုင်မျဉ်းကြောင်း)နှင့် စိုက်ဝင်ဝင်ရိုးကြားတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ထောင့်ကို စိုက်ဝင်ထောင့် (plunge angle) ဟု ခေါ်သည်။



က




ခ



ဂ



ဃ




င

ပုံ-၈။ ။ လွှာတွန့်အမျိုးအစားများကို ပြသော ပုံများ။ (က) တဘက်ခုံးလွှာတွန့်။ (ခ) ချိုးကိုက်ညီလွှာတွန့်ခုံးနှင့် လွှာတွန့်ချိုင့်။ (ဂ) ချိုးကိုက်မဲ့လွှာတွန့်ခုံးနှင့် လွှာတွန့်ချိုင့်။ (ဃ) လွန်ကဲလွှာတွန့်။ (င) တဆစ်ချိုးလွှာတွန့်။

လွှာတွန့်များ ဖြစ်ပေါ်လာချိန်၌ ကျောက်လွှာများ၏ တဘက်တချက်တို့မှ တွန့်ခေါက်မှုကိုဖန်တည်းပေးခဲ့သည့် ဘေးတွန်းအားနှစ်ခုသည် တွန်းအားခြင်းညီမျှနေသော်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လွှာတွန့်သည် မတ်လျက်တည်ရှိနေမည်။ ဝင်ရိုးပြင်သည်လည်း မတ်ထောင်၍ရှိပြီးလျှင်၊ လွှာတွန့်ခြမ်း တို့သည် တူညီသောအဝိုက်ဒီဂရီများကိုဆောင်နေကြပေလိမ့်မည်။ ယင်းကဲ့သို့သော လွှာတွန့်မျိုးကို၊ ချိုးကိုက်ညီလွှာတွန့် (symmetrical fold) ဟုခေါ်လေသည်။ အကယ်၍တဘက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ဘေးတွန်းအားသည် တခြားတဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်ဘေးတွန်းအားထက် လွန်ကဲနေပါမူ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လွှာတွန့်သည်၊ ဘေးတွန်းအားနည်းသော ဘက်သို့ ယိုင်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝင်ရိုးပြင်သည်လည်း စောင်းနေပေမည်။ ယင်းကဲ့သို့သောလွှာတွန့်မျိုးကို၊ ချိုးကိုက်မဲ့လွှာတွန့် (asymmetrical fold) ဟုခေါ်သည်။ ဘေးတွန်းအား တဘက်သည်၊ အချားတဘက်ထက် ထူးကဲစွာလွန်ကဲနေသော်၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည့်လွှာတွန့်သည် အလွန်အမင်း ယိုင်လျက်ရှိကာ၊ လွှာတွန့်ခြမ်းတခုသည် အခြားလွှာတွန့်ခြမ်း၏ အောက်ဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့်အခြေသို့ ရှိနေရာ၊ ယင်းကဲ့သို့သော လွှာတွန့်မျိုးကို၊ လွန်ကဲလွှာတွန့် (overturned fold) ဟု ခေါ်တွင်သည်။

လွန်ကဲလွှာတုန့်မျိုးတူ၍ အကယ်၍ လွှာတုန့်ခြမ်းများသည် မြေပြင်နှင့် အပြိုင်ဖြစ်နေသော်၊ ယင်းတို့ကို **တဆစ်ချိုးလွှာတုန့်** (recumbent fold) ဟု ခေါ်တွင်သည်။ တဘက်ခုံးလွှာတုန့်သည် ကျောက်လွှာတုန့်ခေါက်ခြင်း တမျိုးဖြစ်၍၊ တုန့်ခေါက်ခြင်း၏ တဘက်တချက်တွင်ရှိသော ကျောက် လွှာများသည်၊ ရေပြင်နှင့် ပြိုင်လျက်၊ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ စောင်းလျက် ရှိနေပေသည်။

ကျောက်လွှာလိပ်ခုံးသည် သာမန်အားဖြင့် လိပ်ခုံးသဏ္ဌာန် တုန့်ကြွနေသည့် ချိုးကိုက်ညီလွှာ တုန့်ခုံးဝိုင်းဖြစ်ပြီးလျှင်၊ ယင်း၏ကျောက်လွှာများသည် အလယ်ဗဟိုမှ အဘက်ဘက်သို့ တူညီစွာ ငိုက်ဆင်းနေလေသည် (ပုံ-၉က)။ ဝိုင်းစက်နေသည့် လိပ်ခုံးနှင့်ချိုးကိုက်ညီလိပ်ခုံးမျိုးတို့သည် ရှားပါး လျက် ရှည်လျားလျားသို့မဟုတ် ဘဲဥပုံသဏ္ဌာန်လိပ်ခုံးမျိုးတို့သည် ပေါများလေ့ရှိသည်။ ရှည်လျားလျား ပုံသဏ္ဌာန် လိပ်ခုံးများကို၊ ရေနံချောင်းနှင့် ချောက်မြို့များ၌ တွေ့ရလေသည်။ ယင်းအနေအထား များသည်၊ ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းရာ ကောင်းမွန်လှသည့် ဘူမိအနေအထားများ ဖြစ်ကြသည်။




ပုံ- ၉။ ။ကျောက်လွှာလိပ်ခုံးနှင့် ကျောက်လွှာချိုင့်ဝှမ်း။ (က) ကျောက်လွှာလိပ်ခုံးပုံ။ လိပ်ခုံး ၏ အတွင်းဆုံးပိုင်းတွင်ရှိသော ကျောက်လွှာသည် အသက်အရင့်ဆုံးဖြစ်၍၊ ယင်းကို အသက်ငယ်သော ကျောက်လွှာများက ဝိုင်းရံလျက် ထားသည်။ အ-အ ဖြတ်ပိုင်းပုံတွင် ကျောက်လွှာတို့သည် အလယ်ဗဟိုမှ ဘေးနှစ်ဘက်သို့ ငိုက်ဆင်းနေကြသည်။

(ခ) ကျောက်လွှာချိုင့်ဝှမ်းပုံ။ ကျောက်လွှာချိုင့်ဝှမ်း၏ အနေအထားသည် ကျောက် လွှာလိပ်ခုံး၏ အနေအထားနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ အသက်အငယ်ဆုံး ကျောက်လွှာ ကို အသက်ကြီးရင့်သည့် ကျောက်လွှာများက ဝိုင်းရံလျက်ရှိပြီး လ-လ အလိုက် ဆွဲထား သည့် ဖြတ်ပိုင်းပုံတွင် ကျောက်လွှာတို့သည် အလယ်ဗဟိုဘက်သို့ ငိုက်ဆင်း နေလျက် ရှိကြသည်။

ကျောက်လွှာချိုင့်ဝှမ်းသည် လွှာတူနဲ့လိပ်ခုံး၏ ပြောင်းပြန်နေထား ဖြစ်သောကြောင့် ချိုင့်ဝှမ်းအနောက်အထိမ်းဖြစ်ပြီးလျှင် ယင်း၏ ကျောက်လွှာများသည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့မှ အလယ်ဗဟိုဘက်သို့ ငိုက်ဆင်းလျက်ရှိလေသည် (ပုံ-၉ ခ)။ လွှာတူနဲ့ချိုင့်ဝှမ်း၏ ကျောက်လွှာများသည် အောက်မှအပေါ်သို့ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ထပ်ဆင့်ထားသည့် ပုဂံပြားများနှင့် တူညီလေသည်။

များသောအားဖြင့် လွှာတူနဲ့ခုံးများသည်၊ တောင်ကုန်း တောင်တန်းများနှင့် ထပ်တူညီလျက် လွှာတူနဲ့ချိုင့်များသည်၊ ချိုင့်ဝှမ်းဒေသများတွင် တည်ရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း တိုက်စားမှုဒဏ်ကြောင့်၊ လွှာတူနဲ့ခုံးများကို ချိုင့်ဝှမ်းများတွင် တွေ့ရတတ်၍ လွှာတူနဲ့ချိုင့်များသည်၊ တောင်ကုန်းများအဖြစ် တည်ရှိနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရတတ်သည်။ လွှာတူနဲ့များ၏ အရွယ်အစားမှာ၊ လက်မအနည်းငယ်မှ၊ အက် (ပ်) (Alps) တောင်တန်းများတွင် တွေ့ရသည့် မိုင်ပေါင်းများစွာ ကြီးမားသည့် လွှာတူနဲ့တောင်တန်းများအထိ ကြီးမားသည်ကို တွေ့ရ၏။

လွှာတူနဲ့ခုံးတွင် အသက်ကြီးရင့်သော ကျောက်လွှာများအား အသက်နုသည့် ကျောက်လွှာများက တဆင့်ပြီးတဆင့် ကာရံထားလျက်၊ လွှာတူနဲ့ချိုင့်တွင်၊ အသက်ငယ်ဆုံး ကျောက်လွှာအား အသက်ရင့်သည့်ကျောက်လွှာများက၊ တဆင့်ပြီးတဆင့် ကာရံထားကြသည် (ပုံ-၁၀)။



ပုံ-၁၀။ ။ သာမန်လွှာတူနဲ့များတွင် တွေ့ရသည့် ကျောက်လွှာများ၏ အနေအထားနှင့် ချက်ကို ပြသောပုံများ။ ၁ မှာ အသက်ကြီးဆုံးသော ကျောက်လွှာဖြစ်၍၊ ၄ မှာ အသက်အငယ်ဆုံးသော ကျောက်လွှာဖြစ်သည်။ (က) ချိုးကိုင်ညီညွတ်သော လွှာတူနဲ့ခုံး၊ (ဂ) ချိုးကိုင်ညီညွတ်သော လွှာတူနဲ့ချိုင့်၊ (ဃ) စိုက်ဝင်လွှာတူနဲ့ချိုင့်။ နှိုင်းယှဉ်အသက်စိုက်ဝင်

ဤနည်းအတိုင်းပင် ကျောက်လွှာလိပ်ခုံးတွင်၊ အသက်အကြီးဆုံး ကျောက်လွှာသည် အတွင်းဆုံးတွင် တည်ရှိ၍၊ အသက်ငယ်သော ကျောက်လွှာများသည် အသက်အကြီးဆုံးအလွှာကို အသက်အားဖြင့် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် တလွှာပြီးတလွှာ ဝန်းရံလျက် ရှိကြသည်။ ကျောက်လွှာ ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ကျောက်လွှာလိပ်ခုံး၏ ပြောင်းပြန်နေထားနှင့် သဘာဝကို တွေ့ရှိရသည်။

၃။ ပြတ်ရွေ့ခြင်း


ပြတ်ရွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာ မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကျောက်လွှာများသည် ပြတ်တောက်ခြင်းခံရပြီး ပြတ်ရွေ့ကြောင်း၏ တဖက်တချက်တွင် ကျန်ရှိသည့် ကျောက်လွှာတို့တွင် နေရာရွှေ့ရှားသွားခြင်း ရှိမှုကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကျောက်များ ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး နေရာရွှေ့ရှားသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အက်ကွဲကြောင်းကို ပြတ်ရွေ့ (fault) ဟု ခေါ်သည်။

ပြတ်ရွေ့များသည်၊ ကျောက်အမျိုးအစားအားလုံးတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း၊ အလွှာလိုက်ရှိသည့် အနည်ကျ ကျောက်တွင် လွယ်ကူစွာ မြင်တွေ့ရတတ်လေသည်။ ပြတ်ရွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ကျောက်ပြတ်ရွေ့ရှားမှုသည် လက်မ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်မှ ပေပေါင်း ထောင်သောင်းမက ကြီးမားလေသည်။ ပြတ်ရွေ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကျောက်ရွှေ့ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ရာတွင်၊ ရွှေ့ရှားမှုသည်၊ အက်ကွဲကြောင်း၏ မည်သည့်ဘက်ပိုင်းက ရွှေ့ရှားမှုဖြစ်ပြီး မည်သည့်အပိုင်းက တည်ငြိမ်စွာရှိခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးကပင် ရွှေ့ရှားမှု ရှိခဲ့သည်ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ရန်မလွယ်ကူချေ။ ပြတ်ရွေ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်ကိုသာ သိရလေ့ရှိသည်။ ယင်းမှာ ပြတ်ရွေ့ပြင်၏ နံရံပြင်တခု သို့မဟုတ် နံရံနှစ်ခုစလုံးသည် ရွှေ့ရှားခဲ့သည်ဟူသော အချက်ပင်တည်း။


(က) အခေါ်အဝေါ်များ

ပြတ်ရွေ့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စဉ်၊ ကျောက်လွှာများ ပြတ်တောက် ရွှေ့ရှားသည့်ပြင်ကို ပြတ်ရွေ့ပြင် (fault plane) ဟု ခေါ်သည်။ ပြတ်ရွေ့ပြင်သည် ထောင့်မှန်ကြွလျက်သော်၎င်း မတ်စောက်စွာ စောင်းလျက် သို့မဟုတ် ပြေပြစ်စွာ စောင်းလျက်သော်၎င်း ရှိနေတတ်သည်။ ပြတ်ရွေ့များ မည်မျှ စောင်းသည်၊ မည်သည့်အညွှန်းဖြင့် စောင်းသည်ကို အင်္ဂါ (dip) ဖြင့် တိုင်းထွာရလေသည်။ ယင်းအင်္ဂါမှာ ပြတ်ရွေ့ပြင်နှင့် ရေပြင် ပြိုင်ပြင်တို့၏ ကြားတွင်းရှိ ထောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြတ်ရွေ့ပြင်၏ ရေပြင်ပြိုင် လမ်းကြောင်းကို ငိုက်မတ်ကြောင်း (strike) ဟု ခေါ်သည်။ ပြတ်ရွေ့နှင့် ရေပြင်ပြိုင်တို့၏ တွေ့ဆုံရာ၌ ဖြစ်ပေါ်သည့် လမ်းကြောင်းကို ပြတ်ရွေ့လိုင်း (fault line or fault trace) ဟု ခေါ်သည်။ ပြတ်ရွေ့စောင်း တခု၏အပေါ် ဘက်ပိုင်းနှင့် အပေါ် ဘက်ပိုင်းရှိ ကျောက်များကို အပေါ် နံရံ (hanging wall) ဟု ခေါ်၍၊ ယင်း၏ အောက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ ကျောက်များကို အောက် နံရံ (foot wall) ဟု ခေါ်သည် (ပုံ - ၁၁) ။

ပုံ-၁၁။ ပြတ်ရွေ့မျှား




(က) ပြတ်ရွေ့အစိတ်အပိုင်းများ



(ခ) သားမန်ပြတ်ရွေ့၏ ပြတ်ပိုင်း

(ဂ) ပြန်ပြောင်းပြတ်ရွေ့၏ ပြတ်ပိုင်း




(ဃ) အလျားလိုက် ပြတ်ရွေ့မျှား၏ မြေပြင်တူ ကွေ့ရပုံများ

ပြတ်ရွေ့တခု၏ ရွေ့ရှားမှုသည် အရပ်အမျိုးမျိုးဘက်တိုင်းသို့ မျက်နှာမူနေတတ်ပေသည်။ ယင်း ရွေ့ရှားမှုသည် ထောင့်မှန်ကြွလျက်သော်၎င်း၊ ချောပြင်ပြောင်းလဲလျက်သော်၎င်း၊ ထောင့်မှန်နှင့် ချောပြင် တို့သည်၊ ယခင်က တဆက်တည်း ဖြစ်နေမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ နောင်သောအခါ ပြတ်ရွေ့မှုကြောင့် ပြတ်ရွေ့ပြင်၏တဘက်တချက်တို့တွင် တကွတပြားတည်းရှိ ကျန်ရစ်ခဲ့မည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းအမှတ်အသားတို့၏ စုစုပေါင်း ရွေ့လျားမှုကို အလျော့ (slip) ဟု ခေါ်သည်။ အလျော့မှဆွဲထားသည့်မျဉ်းမတ်ကို အလွဲ (throw) ဟု ခေါ်သည် (ပုံ-၁၁ က)။

(ခ) ပြတ်ရွေ့အမျိုးအစားများ

ပြတ်ရွေ့ပုံ အဖုံဖုံတို့အပေါ် မူတည်၍ ပြတ်ရွေ့များကို သုံးမျိုးသုံးစား ခွဲခြား ထားနိုင်လေသည်။ ယင်းတို့မှာ သာမန်ပြတ်ရွေ့များ (normal faults)၊ ပြန်ပြောင်းပြတ်ရွေ့များ (reverse faults) နှင့် လျားလိုက်ပြတ်ရွေ့များ (tear faults) တို့ဖြစ်ကြသည်။

သာမန်ပြတ်ရွေ့များတွင် အပေါ်နံရံ၏ ကျောက်များသည် ပြတ်ရွေ့ပြင်အလိုက် အောက်ပိုင်းသို့ လျော့ကျနေကြသည်။ ပုံ - ၁၁ ခ တွင် ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဤကဲ့သို့သော ပြတ်ရွေ့များတွင် မြေပြင်ဆန့်ထွက်ကာ ရှည်လျားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သာမန် ပြတ်ရွေ့ငယ်များကို နေရာတကာ၌ အလွန်မှပင် ပေါများလှစွာ တွေ့ရလေသည်။ အုပ်စုလိုက် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ကြီးမားသည့် သာမန်ပြတ်ရွေ့ကြီးများကမူ လှုပ်ရှားပိုင်းများ (mobile belts) အပြင်ရှိ ဘူမိဗေဒအနေဖြင့် အခြေခိုင်သည့် ဒေသများ၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်လေသည်။ သာမန် ပြတ်ရွေ့အုပ်စုများတွင် ပြတ်ရွေ့ပြင်များသည် တဘက်တချက်စီသို့ အလှည့်ကြ စောင်းလျက် ဖြစ်ပေါ် တည်ရှိလာသောအခါ ယင်းအချင်းအရာကို ထုထယ်ပြတ်ရွေ့ခြင်း (block faulting) ဟု ခေါ်သည် (ပုံ - ၁၂)။



ပုံ - ၁၂။ ။ ထုထယ်ပြတ် ရွေ့ခြင်း


အဆိုပါ ပြတ်ရွေ့ခြင်းမျိုးတွင်၊ ဘေးနှစ်ဘက်သို့ စောင်းသွားသည့် ပြတ်ရွေ့များအကြားရှိ မြင့်တက်လာသည့် ကျောက်ထုထယ်ကို မြင့်တက်ထုထယ် (horst) ဟုခေါ်၍၊ ဘေးနှစ်ဘက်မှ ဗဟိုသို့ စောင်းနေသည့် ပြတ်ရွေ့များအကြားရှိ၊ နိမ့်ဆင်းသွားသည့် ကျောက်ထုထယ်ကို နိမ့်ဆင်းထုထယ် (graben) ဟု ခေါ်သည်။

ပြောင်းပြန် ပြတ်ရွေ့များတွင်၊ အပေါ်နံရံ၏ ကျောက်များသည် ပြတ်ရွေ့ပြင်အလိုက် အပေါ်သို့ မြင့်တက်နေကြသည်။ ပုံ ၁၁ - ဂ တွင် ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဤကဲ့သို့သော ပြတ်ရွေ့များတွင် မြေပြင်ကြုံခြင်းကို တွေ့ရလေသည်။ တွန့်ခေါက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး၊ ပြေပြစ်သည့် အငိုက်ရှိသော ပြောင်းပြန်ပြတ်ရွေ့များကို ပြတ်ရွေ့လွန် (thrust) ဟု ခေါ်သည် (ပုံ - ၁၃)။

၃၃၃၃ မြန်မာ့


ပုံ-၁၃။ ။ တွန့်ခေါက်လွန်မှ တတတ ပြတ်ရွေ့လွန်တခု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ပြသသည့်ပုံ

တတိယအမျိုးအစား ပြတ်ရွေ့များသည်၊ အလျားလိုက် ပြတ်ရွေ့များဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ပြတ်ရွေ့ပြင်များသည် ထောင့်မှန်ကြလျက်ရှိကာ၊ ရွှေ့ရှားမှုသည် မိုင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတတ်သည်ကို တွေ့ရသည် (ပုံ-၁၄)။



ပုံ-၁၄။ ။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်စန်အန်းဒရီးပြတ်ရွေ့ကြီး။ ယင်းပြတ်ရွေ့မှာ အလျားလိုက် ပြတ်ရွေ့မျိုးဖြစ်သည်။

စကော့တလန်ပြည်နယ်၏ တောင်တန်းများတွင် အလျားလိုက် ပြတ်ရွေ့များသည် အလွန်အရေးကြီးလေသည် ပုံ-၁၅။ ယင်းတို့တွင်ဂရိတ်ဂလင်ပြတ်ရွေ့ (Great Glen Fault) သည်အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပြတ်ရွေ့မှုကြောင့် ဂရင်းနစ် တိုးဝင်ကျောက်သည် ပြတ်ရွေ့ခံရပြီး ယင်း၏ စုစုပေါင်းရွှေ့ရှားမှုသည် မိုင်ပေါင်း ၆၀ ကျော်လေသည်။



ပုံ-၁၅။ ။(က) စကော့တလန်ပြည်နယ်ရှိ အလျားလိုက်ပြတ်ရွှေ့များနှင့် ယင်းတို့၏ရုစုပေါင်း ရွှေ့ရှားမှုများ (ခ) ဂရိတ်ဂင်လင်ပြတ်ရွှေ့ကြီးမဖြစ်ပေါ်မီ၊ ပြတ်ရွှေ့ကြီး၏ တဖက် တချက်တွင် တည်ရှိသည့် ဒေသများကို ပြသထားသည်။

ပြတ်ရွှေ့များဖြစ်ပေါ်ရာ၌ ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲတို့ ရွှေ့ရှားမှုကြောင့် ပြတ်ရွှေ့တလျှောက် တွင် ကျောက်ခဲများ ကျိုးပဲ့ကုန်လေ့ရှိရာ အဆိုပါကျောက်ကျိုးစများကို ပြတ်ရွှေ့ဘရက်ရှာ (fault breccia) ဟုခေါ်သည်။ ပြတ်ရွှေ့ပြင်တွင်ကျောက်များ လျှော့ကြ သို့မဟုတ်မြင့်တက်သွားသော ကြောင့် အစင်းကြောင်းလေးများ (slickensides) ပေါ်ပေါက်လာတတ်လေသည်။ ယင်းအစင်းကြောင်းလေးများသည် ကျောက်ထုလွှာ ရွှေ့ရှားသွားသည့် တလျှောက်ဘက်သို့ လက်ဖြင့် စမ်းသပ် ကြည့်လျှင် ချောမွတ်လျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရတတ်လေသည်။

၄။ လွှာစဉ်စက်ပြတ်များ

ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ပြင်နှင့် ချိုင့်ဝှမ်းဒေသတို့တွင် အနည်ကျခြင်းသည် အစဉ်တစိုက်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိရာ အနည်ကျကျောက်လွှာတို့သည်လည်း တလွှာပေါ်တလွှာထပ်ဆင့်ကာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် လည်းကမ္ဘာ၏ လွှာရှားမှုတမျိုးမျိုးကြောင့် ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းနှင့် ကုန်းမြေတို့သည် အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုရှိတတ်ရာ၊ အနည်ကျခြင်းသည် ရပ်တန့်၍သွားတတ်လေသည်။ တချို့အခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီးသား ကျောက်လွှာတစ်ခုသည် မြေတွင်းလွှာရှားမှုတမျိုးကြောင့် ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းအခြေ အနေမှကုန်းမြေအခြေအနေသို့ မြင့်တက်ရောက်ရှိလာကာ ကုန်းမြေအခြေအနေတွင် မိုးရေလေ ဆီးနှင်း နှင့် ရေခဲမြစ်များစသည့် သဘာဝအင်အားများ၏ခြေဖျက်တိုက်စားခြင်းကိုခံရပြီး၊ မြေတွင်းလွှာရှားမှု တမျိုးကြောင့်ပင်လျှင်၊ ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတတ်ပေသည်။ တချို့ အခြေအနေများတွင်မူ ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းတို့သည် မြေတွင်းလွှာရှားမှုဖက်ကိုခံရသော်လည်း၊ ကုန်းမြေ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲမှု ရှိခြင်းကင်းမူကာ၊ ယင်းပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်း၌သာ အနည်ကျခြင်း ရပ်တန့် သွားတတ်ပေသည်။

အထက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် အနည်ကြခြင်းရပ်တန့်ပြီးမှ၊ ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်း၌ ပင်လျှင် ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားကျောက်လွှာများအပေါ်တွင် နောက်ထပ်ကျောက်လွှာများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာတတ်လေသည်။ ယင်းကဲ့သို့အားဖြင့် ယခင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသား ကျောက်လွှာတစ်ခုနှင့်နောက်မှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကျောက်လွှာတစ်ခုတို့၏ အကြားတွင် တိုက်စားပြင် (plane of erosion) သို့မဟုတ် ပျံ့ချမဲ့ပြင် (plane of non-deposition) တခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းကို လွှာစဉ်ဆက်ပြတ် (unconformity) ဟု ခေါ်သည်။

အကယ်၍ကျောက်လွှာတို့သည်အနည်ပျံ့ချမှုမပြတ်ဘဲတဆင့်ပြီး တဆင့်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာသော် ယင်းကျောက်လွှာစုတွင် လွှာစဉ်စု (conformable) ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သို့တည်းမဟုတ်ဘဲ၊ အနည်ကြခြင်း အဆက်ပြတ်ပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိခဲ့လျှင် လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှု (unconformable) ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါကျောက်လွှာစဉ်စု တခုနှင့်တခုထိတွေ့နေသည့် ပြင်ကိုလွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပြင် (plane of unconformity) ဟု ခေါ်သည်။ အများအားဖြင့်လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပြင်သည် လှိုင်း၏မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ညီညာမှုကင်းမဲ့နေ၏။

(က) လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှုအမျိုးမျိုး

လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှုများ၏ အနိမ့်အမြင့်သည် လက်မအနည်းငယ်မှ ပေရာပေါင်းများစွာသာမက ထောင်ပေါင်းများစွာအထိမြင့်မားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ဝရင်းကင်းနရော် (Grand Canyon) ၏ သက်ဦးကပ်ဦးပိုင်းအနည်ကြကျောက်များသည်၊ အနိမ့်အမြင့် ပေပေါင်း ၈၀၀ ကျော် ရှိသည့်တိုက်စားပြင်ပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ယင်းကဲ့သို့ပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဘော့စတန် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ဦးကပ်နှောင်းပိုင်း အနည်ကြကျောက်များသည် အနိမ့်အမြင့် ပေပေါင်း ၂၀၀၀ ရှိသည့် တိုက်စားပြင်ပေါ်၌ တင်လျက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရလေသည်။ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်၏ အပေါ်နှင့်အောက်ဘက် နှစ်ခုလုံးတွင်ရှိကြသည့် ကျောက်လွှာစုများ၏ အငိုက်သည် လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပွိုင့် (disconformity) ဟု ခေါ်တွင်သည် (ပုံ-၁၆) ။ အကယ်၍ အထက်ဖော်ပြသောလျှင်ရှိနေခဲ့သော်၊ ယင်းကို လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပွိုင့် (paraconformity) ဟု ခေါ်သည်။ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပွိုင့်တခုကို ကွင်းထဲ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန် အလွန်ခဲယဉ်းလေသည်။

ကျောက်လွှာစုများ၏ အငိုက်များသည် တူညီမှုမရှိဘဲ၊ ပြိုင်နေခြင်းကင်းမဲ့နေလျှင်၊ ယင်းတို့၏ အကြားတွင် ထောင့်ကြလွှာစဉ်ဆက်ပြတ် (angular unconformity) တခု ဖြစ်ပေါ်နေပေမည်။ အကယ်၍ အပေါ်ဘက်၌တည်ရှိနေသော အလွှာလိုက်ရှိသည့် ကျောက်လွှာစုနှင့်အောက်ပိုင်း၌ တည်ရှိသည့် လွှာခြင်းကင်းမဲ့နေသည့် အသွင်ပြောင်း သို့မဟုတ် မီးသင့်ကျောက်အကြား၌ တိုက်စားပြင်တခုတည်ရှိနေလျှင်၊ အဆိုပါတိုက်စားပြင်ကို လွှာမဲ့လွှာစဉ်ဆက်ပြတ် (non-conformity) ဟု ခေါ်တွင်သည်။



ပုံ - ၁၆။ ။


လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်အမျိုးမျိုးများ။

(က) ထောင့်ကြွလွှာစဉ်ဆက်ပြတ်

(ခ) တိုက်စားလွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပြိုင်

(ဂ) လွှာစဉ်စုနစ်ခုစလုံးစောင်းနေသည့်တိုက်စားလွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ပြိုင်



(ဃ) လွှာမဲ့လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်



မှက်ချက်။ ။

များပြားသည့် မျဉ်းသုများသည်လွှာစဉ် ဆက်

ပြတ်များဖြစ်ကြသည်။



(၈) လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ခြင်း၏အထောက်အထားများ

ကျောက်လွှာစုများသည် ပြိုင်နေခြင်းကင်းမဲ့နေလျှင်၊ ယင်းပြိုင်နေမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည် လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ခြင်း၏ အလွန်ပင်သိသာသော အထောက်အထားပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျောက်လွှာစုနှစ်ခုစလုံးပင် တွန့်ခေါက်နေသော်လည်း အောက်ပိုင်းရှိကျောက်လွှာစုသည်အပေါ် ပိုင်းရှိကျောက်လွှာစုထက်ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ တွန့်ခေါက်နေပါလျှင်လည်း၊ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ခြင်း၏ အထောက်အထားတခုပင်ဖြစ်သည်။

ကျောက်လွှာများ၏ ကြား၌တိုက်စားပြင်ရှိလျှင်လည်း လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ရှိသည်ဟု ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ယူဆရလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အောက်ပိုင်းရှိကျောက်လွှာစုသည် ပင်လယ်တွင်း၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်၊ မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ကုန်းမြေအဖြစ်မြင့်တက်လာကာ၊ သဘာဝ၏တိုက်စားမှုခံရပြီးလျှင်၊ တဖန်ပင်လယ်အောက်သို့နိမ့်ဆင်းသွားပေမည်။ ထိုနောက်မှအပေါ်ပိုင်းရှိကျောက်လွှာများ၏ ထပ်ဆင့်ခြင်းကိုခံရပြီးသောအခါမှ အဆိုပါကျောက်လွှာစုနှစ်ခုစလုံးသည်၊ ကုန်းမြေအဖြစ်သို့မြင့်တက်တည်ရှိလာကြမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းတို့၏အကြား၌ တိုက်စားပြင်တခု ကျန်ရှိနေမည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။

အပေါ်ပိုင်းရှိ ကျောက်လွှာတို့၏ အောက်ခြေ၌ စရစ်ဖြုန်း ကျောက်တွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်လျှင် တိုက်စားပြင်တခုရှိခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်၍ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ရှိမှုကိုပြသပါသေးသည်။

အောက်ပိုင်းကျောက်လွှာတို့တွင် အပေါ်ပိုင်းကျောက်လွှာထက်ပိုမိုတွန့်ခေါက်ခြင်း၊ ပြတ်ရွှေ့ခြင်း၊ ကြိုးပဲ့ခြင်းစသော မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏ သက်သေသာဓကများကို တွေ့ရှိလျှင်လည်း၊ ယင်း ကျောက်လွှာတို့၏ အကြား၌ယင်းရှားသော လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်တခုရှိသည်ဟု ခိုင်လုံစွာ သိရှိရပေမည်။ အောက်ပိုင်းကျောက်သည် လွှာခြင်းကင်းမဲ့သည့် အသွင်ပြောင်း သို့မဟုတ် မီးသင့်ကျောက်များဖြစ်နေလျှင်လည်း၊ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်ရှိနေမှုကို ပြသနေပေမည်။

အောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်း ကျောက်လွှာများတွင်တွေ့ရှိရသည့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည်၊ အမျိုးအစားခြင်းထူးခြားစွာ ခြားနားနေလျှင်လည်း၊ လွှာစဉ်ဖြစ်ခြင်း၌ အချိန်အားဖြင့် ခြားနားမှုရှိသည်ကို ပြသနေသည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းကျောက်လွှာတို့၏ကြားတွင် လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှုရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်လေသည်။

(ဂ) လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှု၏ အရေးကြီးပုံများ

လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှုသည်၊ ဒေသတခု၏ ဘူမိသမိုင်းကို လေ့လာရာ၌ အလွန်အရေးကြီးသည့် အချက်တခုပင်ဖြစ်သည်။ လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်မှုတခုကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသသည် ပင်လယ်အခြေအနေမှ ကုန်းမြေအခြေသို့မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်ဟူသော ဘူမိပြောင်းလဲချက် အမျိုးမျိုးတို့၏ ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုများကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်သုတ်ဖော်တွက်ချက်၍ရလေသည်။ တချို့သော လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်များသည် ထောင်မျှလောက်သော နှစ်အရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ တခြား လွှာစဉ်ဆက်ပြတ်များကမူ နှစ်ပေါင်းသန်း ၄၀၀ လောက်ရှိသောအချိန်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်။


၅။ မြေလျင်လှုပ်ခြင်း

မြေလျင်လှုပ်ခြင်းမှာ ကမ္ဘာ့အတွင်းပိုင်းရှိ ကျောက်များသည် ဒဏ်အမျိုးမျိုး ခံရသောကြောင့်၊ တုန်လှုပ်ကာထွက်ပေါ်လာသည့် လှိုင်းများပင်ဖြစ်ပေသည်။ တုန်ခါခြင်းသည်ကျောက်များ၏ ခိုင်မာခြင်းအားထက် ပိုမိုပြင်းထန်လေသော်၊ ကျောက်များ အက်ကွဲပြီး ပြတ်ရွှေ့များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ယင်းလှုပ်ရှားမှုများသည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ တည်ငြိမ်ခြင်းကင်းမဲ့မှုကို ပြသလျက်ရှိနေကြသည်။


မြေလျင်လှုပ်ခြင်းကို လူသားတို့သည် လွန်စွာရှေးကြသည့် ခေတ်များကပင် သိထားပြီး၊ များစွာ ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ မြေလျင်များသည် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သည့် ဖျက်စီးမှုများတွင် အကြီးအကျယ်ဆုံးနှင့် ကြောက်ရွံ့စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုသည် ကြောက်ရွံ့စရာ ကောင်းသော်လည်း မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်၍ မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုသည် သို့သော်လည်း မြေလျင်လှုပ်ရှားမှုတွင်၊ လှုပ်ရှားမည့်နေရာမှ ဒေသကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်သည်။ မြေလျင်လှုပ်မှုကိုလူသားတို့ပိုမိုကြောက်ရွံ့ကြလေသည်။ ကြိုတင်မသိရှိနိုင်သောကြောင့်

(က) မြေငလျင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ


မြေငလျင်လှိုင်းများကို ဖြစ်ပေါ်ရန် ဖန်တည်းပေးနိုင်မည့် အချက်များမှာ (၁) မီးတောင် ပေါက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ် ပြတ်ရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်ကြရာ၌ ကျောက်များ ကွဲအက်ခြင်း။ (၂) မီးတောင် အနုမြူဗုံးပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ကျောက်တောင်များဖြိုရာ၌ရပ်ခြင်း ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပဲ့တင်သံများနှင့် (၃) ပြတ်ရွှေ့ခြင်း၊ တောင်ပြိုဆင်းခြင်းနှင့် ရေအောက်ကျောက်များပြိုကြခြင်းတို့တွင်၊ ညီညာခြင်း ကင်းမဲ့သည့် ကျောက်ပြင်များ တခုနှင့်တခု ပွတ်တိုက်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ကြသည်။




၁၈၀၀-ခုနှစ်



၁၈၇၅-ခုနှစ်



၁၉၀၆-ခုနှစ်



၁၉၀၆-ခုနှစ်

ပုံ-၁၇။

။စန်အန်ဒရီး (၆) ပြတ်ရွှေ့တလျှောက် မြေတွင်း လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အက်ကွဲ ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ။ ယင်းပြတ်ရွှေ့ ကြောင့် ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် ကာလီဖိုးနီးယားမြေငလျင်ကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

မြေငလျင်များဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာမူ ပြတ်ရွှေ့မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြတ်ရွှေ့ အသစ် ပေါ်ပေါက်ရာ၌၎င်း၊ ရှိရင် စွဲ ပြတ်ရွှေ့ပြန်လည်အသက်ရှင်ပြီး လှုပ်ရှားလာသော ကြောင့်သော်၎င်း ကြီးမားသည့် မြေငလျင်များ ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပဲ ဖြစ်ပေါ်သည့် မြေငလျင်များ မှာမူ အသေးစားလေး များသာ ဖြစ်သည်။ ၁၈၈၃ ခုနှစ်တွင်ကရာကတိုဝါ (Krakatoa) နှင့် ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ကတ်မေ (Katmai) စသည့်ပြင်းထန်လှသည့် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီး များ၌ပင်လျှင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် မြေငလျင် လှိုင်းများသည် ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် ပြင်းထန်ခြင်း ကင်းမဲ့လေသည်။

မြေငလျင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပြတ်ရွှေ့ခြင်းတို့၏ ပတ်သက်နေမှုကို ၁၉၀၆ ခု၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက် နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကာလီဖိုးနီးယား၏ မြေငလျင်ကြီးက ထင်ရှားစွာ ပြသထားလေသည်။ ဤမြေငလျင်ကြီးနှင့် တချိန်တည်း၌ပင်၊ စန်အန်ဒရီး (၆) (San Andreas) ပြတ်ရွှေ့ကြီး သည်အနည်းဆုံးမိုင်ပေါင်း ၂၇၀ ခန့်ကျယ်ဝန်း သည့် ဒေသအတွင်း၌ ရွှေ့ရှားမှုရှိသည်ကို သိရှိရ လေသည်။ ပြတ်ရွှေ့လှုပ်ရှားမှုသည် အလျားလိုက် ဖြစ်ပြီး ပြတ်ရွှေ့နှင့်ပြိုင်နေသော်လည်း ပြတ်ရွှေ့ မှာမူ ထောင့်မှန်ကြွလျက်ရှိသည် (ပုံ-၁၇)။

ယင်းပြတ်ရွေမှုကြောင့် အနောက်တောင်ဘက်ရှိ ကျောက်ထုသည် မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့ရှားသွားပြီး၊ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ကျောက်ထုကမူ တောင်ဘက်သို့ ရွေ့ရှားသွားလေသည်။ အများဆုံး ရွေ့ရှားမှုမှာ ၂၁ ပေ ရှိလေသည်။


အထက်ပါ ကဲ့သို့ပင်၊ မက္ကဆီကိုပြည်၏ ဆိုနိုးရား (Sonora) တွင် ၁၈၈၇ ခုနှစ်၌ လှုပ်ရှားသည့် မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ၃၅ မိုင် ရှည်လျားသည့် ပြတ်ရွေတွင် ၂၆ ပေ ထောင်လိုက် ရွေ့ရှားမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် ရွေ့ရှားသည့် အိန္ဒိယပြည်၊ အာသံပြည်၏ ချီဒရန်း (Chedrang) ပြတ်ရွေခြင်းတွင်လည်း ထောင်လိုက်ရွေရှားမှု ၃၅ ပေ ရှိလေသည်။ ဂျပန်ပြည်၌ ၁၈၉၁ ခုနှစ်တွင် လှုပ်ရှားသည့် မိနိုအိုဝါရှိ ပြတ်ရွေ၌၊ အလျားလိုက် ၁၃ ပေနှင့် ထောင်လိုက် ၂၀ ပေ ရွေ့ရှားမှုရှိသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြတ်ရွေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော်လည်း၊ အနည်းငယ်မျှသော ပြတ်ရွေများသည်သာ မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်နေသည်ကို သိရှိရသည်။ သို့သော်လည်း မြေငလျင်အများအပြားတို့သည်၊ မြုပ်ကာဖုံးကွယ်နေသော ပြတ်ရွေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။

(ခ) ဆွဲဆန့်ကြိုးပဲ့ခြင်း အယူအဆ (Elastic Rebound Theory)


မြေငလျင်များနှင့် ပြတ်ရွေများ၏ ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်မှုကို ဆွဲဆန့်ကြိုးပဲ့ခြင်းအယူအဆဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လေသည်။ ယင်းအယူအဆကို ရိုင်ဒ် (H. F. Reid) နှင့် တခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကာလီဖိုးနီးယား၏ ၁၉၀၆ ခုနှစ် မြေငလျင်ကြီးအပေါ် အကြောင်းပြု၍ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအယူအဆအရ ခိုင်မြဲစွာ ရှိနေကြသည့် ပြတ်ရွေတဘက်တချက်တို့မှ ကျောက်တို့သည်၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲပေးခြင်းအားဖြင့် ဒဏ် (strain) ကို ယင်းတို့၏ ဆွဲဆန့်နိုင်ခြင်း အဆုံးစွန်သို့ ရောက်ရှိသည်အထိ တဖြေးဖြေး စုဆောင်းထားနိုင်ကြသည်။

ထိုအခြေအနေမှ လွန်လျှင် ကျောက်တို့သည် ရုပ်ခြင်းကြိုးပဲ့ကာ၊ စုဆောင်းပိတ်ဆို့ထားသည့် အားသည်လည်း၊ မြေငလျင်လှိုင်းများအသွင်သို့ ပြောင်းကာ လျော့နည်းသွားလေသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်သွားလျှင်၊ ကျောက်များသည်လည်း နဂိုရုပ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သို့ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိလာကြမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ ပြတ်ရွေခြင်းခံရကာ၊ အလွဲလျက်တည်ရှိနေကြပေမည်။ ယင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဖြစ်ပျက်မှုသည် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်ပျက်နိုင်လေသည်။


ဆွဲဆန့်ကြိုးပဲ့ခြင်းကို ပုံ-၁၈ တွင် သိသာရန် ဆွဲပြထားသည်။ ၀ အမှတ်သည်၊ ပြတ်ရွေပေါ်၌တည်ရှိပြီး၊ က နှင့် ခ တို့သည် ပြတ်ရွေ၏တဘက်တချက်၌ ရှိကြသည်။ (က) အချိန်၌ ဒဏ်သည် ကျောက်များအတွင်း၌ စုဆောင်းမိခြင်းမရှိသေးရာ၊ မျဉ်းကြောင်း က ၀ ခ သည် ဖြောင့်တန်းနေပေမည်။ (ခ) အချိန်၌၊ ကျောက်များအတွင်းတွင် ဒဏ်စုဆောင်းမိပြီ ဖြစ်သော်လည်း၊ မြေငလျင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိသေးဘဲ၊ က နှင့် ခ အမှတ်တို့သည် ရွေ့ရှားသွားကာ၊ မျဉ်းကြောင်း က ၀ ခ သည် ကောက်ကွေး သွားပေမည်။ ဤအခြေအနေသည် သံမဏိကြိုးတခုကို ကွေးကောက် လိုက်သည့်အခါ



(က)



(ခ)




(ဂ)

ပုံ-၁၈။ ဆွဲဆန့်ကြိုးပုံခြင်း၊ (က) ဒဏ် (strain) စုဆောင်းခြင်း မတိုင်မီ။ (ခ) ဒဏ် စုဆောင်းပြီးသည့်အခါ ဖြစ်သော်လည်း မြေလျင်မဖြစ်ပေါ်မီ။ (ဂ) မြေလျင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ဒဏ်လျော့နည်းသွားသည့်အခါ။

ပေါ်ပေါက်လာသည့်ပုံမျိုးနှင့် တူညီလေသည်။ (ဂ) အချိန်၌ မြေလျင် လှုပ်ပြီးမည်ဖြစ်ရာ၊ နဂို ဝ တွင်ရှိသည့် အမှတ်သည် ဝ' နှင့် ဝ'' တို့သို့ အသီးသီးရွေ့သွား၍ ပြတ်ရွေ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလျှင် ကဝ' နှင့် ဝ'' ခ အပိုင်းတို့သည် ဖြောင့်တန်းနေကြကာ၊ စုဆောင်းထားရှိသည့် ဒဏ်သည် လျော့သွားပေ မည်။

(ဂ) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လျော်လှုပ်ရာ အပိုင်းကြီးများ

မြေလျော်လှုပ်ပိုင်းများသည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ဖျောက်ရှိ ဝှံ့နှံ့နေသော်လည်း၊ မြေလျော်လှုပ်မှုများ စတင်ဖြစ်ပေါ်ရာ ဒေသများသည် သိပ်မများပြားလှချေ။ အပြင်းထန်ဆုံးသော မြေလျော်လှုပ်မှုများသည် ကမ္ဘာ၏ အပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းတွင်သာ ဖြစ်ပွားလေသည် (ပုံ - ၁၉) ။ ယင်းတို့မှာ (၁) တောင်နှင့် မြောက် အမေရိကတိုက်၏ အနောက် ပစိဖိတ်ကမ်းခြေနှင့် အာရှတိုက်၏ အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေများ



ပုံ-၁၉။ ။ ကမ္ဘာ့မြေလျော် လှုပ်ရှားရာ အပိုင်းကြီးများ ပြသည့်မြေပုံ။ အမဲစက်များသည် နှစ် (၂၀) အတွင်း လှုပ်ရှားသည့် မြေလျော်လှုပ်မှုကို ပြသသည်။

ပါဝင်သည်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ ကမ်းခြေပိုင်းနှင့် (၂) အနောက်ဘက် ဥရောပတိုက်မှ အရှေ့ဘက် အာရှတိုက်ဘက်သို့ တန်းနေသည့်အပိုင်း။ ယင်းအပိုင်းသည် စပိန်နှင့် အာဖရိကတိုက် မြောက်ပိုင်းမှ အီတလီ၊ ဂရိ (၆)၊ တူရကီ၊ အီန္ဒိယနှင့် မြန်မာပြည်တို့မှ တဆင့်ဆယ်လီဘီး (၈) ကျွန်းသို့ ဆင်းသွားကာ၊ ပစိဖိတ်အပိုင်းနှင့် ဆက်သွားလေသည်။

သေးငယ်သော လျော်လှုပ်ပိုင်းများသည်၊ အာတိတ်၊ အတ္တလန်တိတ်နှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့၏ ပင်လယ်အောက် ကုန်းတန်းများနှင့် ဆိုက်ဗေးရီးယားအလယ်ပိုင်းရှိ အရှေ့ဘက် ဒေသများ၏ မြင့်တက်ပိုင်းများ (rift zones) ၌ တည်ရှိသေးသည်။



ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကမ်းခြေအပိုင်းသည် မြေလျင်များ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလွန်ရာ အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့မီးတောင်အများစု၏ တည်ရှိရာလည်း ဖြစ်လေသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့် ဒုတိယပိုင်းသည် အခြား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသော မြေလျင် လွှပ်ရာအပိုင်းဖြစ်သည်။

အဓိက မြေလျင် လွှပ်ရာအပိုင်းများသည် ကမ္ဘာ့ကျောက်လွှာများ၏ စောက်နက် ဆင်ခြေ လျော့နှင့် ထုနိမ့်ကြ ပြတ်ရွှေ့များတည်ရှိသည်။ အများအားဖြင့် များမကြာသေးမီ ဘူမိအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ့ မြေပြင် မြင့်တက်မှု ဖြစ်လာသော သက်နဲ့ တောင်တန်း ဒေသများအတွင်းတွင် တည်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ၏ မြင့်တက်နေသော ဒေသများနှင့် နိမ့်ကြနေသော ဒေသများ၏ ကွေ့ထိရာအပိုင်း များသည်။ အခြေအနေ မခိုင်မြဲသည့် အပိုင်းများ ဖြစ်သည့်အပြင် အကြီးကျယ်ဆုံးနှင့် အနက်ရှိုင်းဆုံးသော မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ရာအပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ရက ကောင်းလှသည်။ ဘူမိဗေဒအားဖြင့် အသက်ကြီးရင့်သည့် ကနေဒါအရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဘရာဇီး(လ်)၊ စကင်ဒီနေဗီးယား ဆိုက်ပေးရီးယားနယ်အချို့၊ အာဖရိကတိုက်၏ ဒေသအများအပြား၊ အိန္ဒိယပြည် တောင်ပိုင်းနှင့် ဩစတြေးလီးယားတိုက် အနောက်ပိုင်း (ထုနိမ့်ကြ ပြတ်ရွှေ့ပိုင်းများမှအပ) များ၏ အတွင်းပိုင်းကြသည့် ဒေသများသည်၊ များသောအားဖြင့် မြေလျင်လှုပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးလေ့ ရှိကြသည်။ ဟာဝေယန် ကျွန်းစု၏ အပြင်ဘက်ရှိ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာချိုင့်ဝှမ်း၏ အလယ်ပိုင်းသည်လည်း၊ မြေလျင်ဒဏ်မှ ကင်းဝေးသည်။

တချို့မြေလျင်များသည်၊ ကမ္ဘာ၏အလှုပ်ရှားဆုံး အပိုင်းများအတွင်း၌ တည်ရှိခြင်းမရှိဘဲ ယခုခေတ်မီးတောင်များအပြင်ခေတ်နှောင်းမီးတောင်ဖြစ်ခြင်းဒေသတို့နှင့်ဝေးကွာသည့်နေရာများတွင် တည်ရှိကြသည်။ တချို့သောမြေလျင်အငယ်စားများသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဖြစ်ထွန်းနေသည့် ဒေသများ၌တွေ့ရှိရသေးသည်။ ယင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဝန်များ၏ ဖိပို့ခြင်းဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ တချို့သောမြေလျင်လေးများသည် ရေခဲမြစ်များအရည်ပျော်ရာမှ၊ အလေးချိန်ပေါ်သွားခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်ကို သိရှိရသည်။

(ဃ) လျင်လှိုင်းများ


မြေလျင်လှုပ်ရှားမှုတွင်၊ လျင်လှိုင်းသုံးမျိုးပေါ်ပေါက်လာသည်။ ပထမအမျိုးအစားများမှာ မူလဆင့်(မြန်သည့်) လျင်လှိုင်းများ (primary (fast) waves) ဖြစ်၍၊ လှိုင်းလှိုင်းကြောင်းအလိုက် ရွေ့တိုးနှောက်ငင်ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ကာ တုန်လှုပ်ပြန့်ထွက်လာကြသည်။ ဒုတိယအမျိုးအစားမှာ အလယ်ဆင့် (နှေးသည့်) လျင်လှိုင်းများ (secondary (slow) waves) ဖြစ်ကြ၍၊ လျင်ဖြတ်သွားရာ လှိုင်းကြောင်းကို ထောင့်မှန်ကြကာ၊ တွန့်လိမ်၊ ပြတ်တောက်ပြီး၊ တုန်လှုပ်လာကြသည်။ တတိယအမျိုးအစားမှာ လျင်လှိုင်းရှည် (နှောင်း) များ (long (last) waves) ဖြစ်ကြပြီး၊ ရှုပ်ထွေးစွာတွန့်လိန်သည့်အနေအထားရှိကာ၊ ကမ္ဘာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ် တောက်လျှောက် ပြန့်ထွက်လာကြသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့် ပထမနှင့် ဒုတိယအမျိုးအစားလှိုင်းများသည်၊ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွင်းသို့ ဖြတ်သန်းလာကြသည့် လှိုင်းများဖြစ်ကြသည် (ပုံ ၂၀၊ ၂၁)



ပုံ-၂၁။ မြေလျင် လှိုင်းသုံးမျိုးကိုပြသည့်ပုံ။ ယင်းမြေလျင်လှိုင်းများ၏ အမြန်နှုန်းကိုပါ ဖော်ပြထားသည်။

(င) မြေလျှင်တိုင်းကိရိယာ (Seismograph)


လျှင်လှိုင်းများအား မြေလျှင်တိုင်းကိရိယာဖြင့် မှတ်တမ်းယူထားရလေသည်။ လျှင်တိုင်းကိရိယာတွင်အဓိကအားဖြင့်ချိန်သီး (pendulum) ပါဝင်လေသည်။ မြေတိုင်းကိရိယာတည်ဆောက်ပုံအမျိုးမျိုးရှိလေရာတွင်၊ သင်ပြရာ၌ အလွယ်ကူဆုံးကိရိယာပုံစံကို ပုံ - ၂၂ တွင်ရေးဆွဲပြထားလေသည်။



ပုံ - ၂၂။ မြေလျှင်တိုင်းကိရိယာ

ယင်းမြေလျှင်တိုင်းကိရိယာတွင်၊ ကျောက်မြေ၌ စိုက်ထားသည့် သတ္တုတိုင် နှစ်ခု ပါဝင်သည်။ တခုသော သတ္တုတိုင်တွင် စပလိန်ဝါယာဖြင့် တံလောင်း ချိတ်ဆွဲထားသောလေးသည့် ချိန်သီးတခု ပါဝင်ပြီး၊ တခြားသတ္တုတိုင်တွင် ဂရပ်မျဉ်းများပါ (graphs) ရှိသည့် စက္ကူပတ်ထားပြီး လည်နေသော စည်တခု ရှိလေသည်။ မြေလျှင် လှုပ်ရှားမှုရှိလျှင် ကျောက်တွင်စိုက်ထားသော သံတိုင်သည် တုန်ခါကာ၊ ယင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် ချိန်သီးသည် လှုပ်ရှားပြီး လည်နေသည့် စည်ပေါ်ရှိ ဂရပ်စက္ကူပေါ်၌ မြေလျှင် လှုပ်ရှားမှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ကွေးကောက်သော မျဉ်းကြောင်းဖြင့် ရေးချစ်မှတ်သားထားလေသည်။

အဆိုပါ မြေလျှင် လှုပ်ရှားမှုကို မှတ်သားထားသည့် မျဉ်းကြောင်းကို မြေလျှင်မျဉ်း (seismogram) ဟု ခေါ်တွင်သည်။ မြေလျှင်မျဉ်းနမူနာတခုကို ပုံ - ၂၃ တွင် ပြထားလေသည်။




ပုံ - ၂၃။ မြေလျှင်တိုင်း ကိရိယာ မှတ်သားထားသည့် မြေလျှင်တခု၏ မြေလျှင်မျဉ်း (အသယ်မျဉ်း) ။ ယင်းမြေလျှင်မှာ မြေလျှင်တိုင်း ကိရိယာနှင့် မိုင်ပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့် ကွာဝေးသော ဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ က မှာ မြေလျှင်မလှုပ်မီ တနာရီ ခန့်က မှတ်သားထားသည့် တုန်ခါခြင်းကင်းမဲ့သည့် မျဉ်းဖြစ်သည်။ ခ သည် မြေလျှင်လှုပ်ပြီး တနာရီအကြာတွင် မှတ်သားထားသည့် လှိုင်းငယ်ကလေးများဖြစ်သည်။

မြေလျှင်တိုင်း ကရိယာကို အသုံးပြုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြေလျှင်များသည် ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် နှစ်မိနစ်တခါ လှုပ်ရှားနေသည်ဟု သိရလေသည်။ ပိုမို ပြင်းထန်သည့် မြေလျှင်များသည် တပတ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်တခါလောက်တွင် လှုပ်ရှားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် အမြဲတိုင်းလိုလိုပင် လှုပ်ရှားနေသည်ဟု ယူဆ၍ရလေသည်။

(စ) ငလျင်ဗဟိုချက် (focus) နှင့် ငလျင်မြေပြင်ဗဟိုချက် (epicenter)

ကမ္ဘာမြေကြီးရှိ မြေလျှင်စတင်ပေါက်ပွားရာ ဗဟိုချက်ကို ငလျင်ဗဟိုချက် (focus) ဟု ခေါ်သည်။ ယင်းငလျင်ဗဟိုချက်၏ အထက်တည့်တည့် တည်ရှိရာ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အမှတ်ကို ငလျင်မြေပြင်ဗဟိုချက် (epicenter) ဟု ခေါ်သည်။

ငလျင်မြေပြင်ဗဟိုချက်ကို တွက်ချက်ရှာဖွေရာတွင် မြို့သုံးမြို့ သို့မဟုတ် သုံးမြို့ထက် ပိုသည့် မြို့များ၏ မြေလျှင်တိုင်း ကရိယာများဖြင့် တိုင်းထွာ တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည် (ပုံ-၂၄)။



ပုံ-၂၄။ ။ ငလျင်မြေပြင် ဗဟိုချက်ကို တွက်ချက်ရှာဖွေပုံ။ တွက်ချက်နည်းကို တွဲအက်စာပိုဒ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ယင်းငလျင်တိုင်း ကရိယာအသုံးသုံးတို့၏အကူအညီဖြင့် မြန်သည့်မူလဆင့် ငလျင်လှိုင်းများနှင့် ပိုမိုနေးသည့်အလယ်ဆင့် ငလျင်လှိုင်းများ၏ အချိန်နှုန်းကွာခြားမှုကို တွက်ချက်ကာ၊ ယင်းလှိုင်းများဖြတ်သန်း

လာရသည့် ခရီးအကွာအဝေးကိုမှန်းဆနိုင်လေသည်။ ရရှိသည့်ခရီးအကွာအဝေးတို့၏ အချင်းဝက် ကိုယူ၍ မြေပုံပေါ်တွင် စက်ဝိုင်းသုံးခုကိုရေးဆွဲလျှင် စက်ဝိုင်းများဆုံရာအမှတ်တခုကို ရရှိပေမည်။ ယင်း စက်ဝိုင်းများဆုံရာအမှတ်သည် ငလျင်မြေပြင် ဗဟိုချက်ပင်ဖြစ်သည်။

(ဆ) ဆိုးဝါးလှသော ငလျင်များအကြောင်း သမိုင်းအကျဉ်း

ပေါ်တူဂီပြည်၊ လစ်ဘွန်းမြို့တွင် ၁၇၅၅ ခုနှစ်ဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၉ နာရီနှင့် မိနစ် ၄၀ တွင်ကြီးမားသည့်မြေငလျင် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငလျင်သည် ၆ မိနစ်မှ ၇ မိနစ်အထိသာ ကြာရှည်သော်လည်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့် အဆောက်အဦးများစွာတို့ ပျက်စီးပြီး ထောင်သောင်းများစွာသောလူများ အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ မသေ၍ကျန်ရစ်ခဲ့သောသူများသည်ပင်လယ်ကမ်းပါးရှိကျောက်မိုင်းတခုထဲသို့ သွားရောက်ခိုလှုံခဲ့သော်လည်း၊ နောက်မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင်လှုပ်သည့် ဒုတိယငလျင်လှိုင်းများကြောင့် ရေများ၏ဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံကြရပြီး သေကြေပျက်စီးကုန်ကြသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုများပြားစေသည့် ပြင်းထန်သည့်ငလျင်သည် တတိယအကြိမ်အဖြစ် မွန်းတည့်ချိန်၌ ထပ်မံလှုပ်ရှားပြန်သေးသည်။

ယင်းငလျင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် သင်္ဘောဆိပ်မှရေများသည် အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာထဲသို့ အားလုံးဆုတ်ခွာပြီး နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင်တဖန် ရေများသည်လွန်စွာကြီးမားသော ရေလှိုင်းကြီးများအသွင်ဖြင့် ဆိပ်ကမ်းဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသည်။ ယင်းလှိုင်းကြီးများသည် ပေပေါင်း ၁၆ မှ ၅၀ ပေအထိမြင့်မားပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ မိုင်ဝက်အထိ ရောက်ရှိဖုံးလွှမ်းသွား၏။ လှိုင်းများပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြသောအခါ၊ သင်္ဘောများတံတားများနှင့် အဆောက်အဦးများသာမကလူများ၏အသက်များပါ ပျက်စီးပြီး ပင်လယ်ထဲသို့မျောကုန်သွားကြ၏။ ယင်းကဲ့သို့အလားတူ ၁၅ ပေမြင့်မားသည့် ပင်လယ်လှိုင်းသုံးခုတို့သည် နောက်လေးနာရီအတွင်း ပြန်လည်ပေါ်ပေါက် ရောက်ရှိလာပြန်သေးသည်။ လစ်ဘွန်းငလျင်ကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်လေးများသည် ဆက်လက်ကာ၊ လပေါင်းများစွာအတွင်း ထပ်မံလှုပ်ရှားခဲ့သေးသည်။ ယင်းငလျင်ကြီး၏လှုပ်ရှားမှုကို ၁,၂၅၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်ပေါင်းကျယ်ပြန့်သည့်ဒေသများအတွင်း ခံစားခဲ့ရလေသည်။

အလားတူပင် ဆိုးဝါးလှသည့်မြေငလျင်များကို၊ ၁၈၁၁ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖ်ဆီချီပြည်နယ်ရှိနယူးမဒရစ်တွင်၎င်း၊ ကာရိုလင်းနားတောင်ပိုင်းရှိချား (လ်) မြို့၌ ၁၈၈၆ တွင်၎င်း၊ အိန္ဒိယပြည်၊ အာသံနယ်၌ ၁၈၉၇ခုနှစ်တွင်၎င်း၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် စန်ပရန်စစ္စကိုမြို့၌ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင်၎င်း၊ ဂျပန်ပြည်၊ စဂါမိပင်လယ်ကွေ့၌ ၁၉၂၃ခုနှစ်တွင်၎င်း၊ အယ်ဂျီနီးယားပြည်၊ အော်လီရင်ဗီလ်၌ ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင်၎င်း၊ မွန်တားနားပြည်နယ်၊ ဟက်ဂင်မြို့၌ ၁၉၅၉ခုနှစ်တွင်နှင့် အခြားဒေသများတွင်၎င်း၊ များပြားလှစွာတွေ့ရှိရသည်။

(င) မြန်မာပြည်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့မြေလျင်များအကြောင်း အကျဉ်း

မြန်မာပြည်သည် ဟိမဝန္တာတန်းခေါက်တောင်တန်း၏ တောင်ဖြစ်မှုနှင့်အကြီးဝင်နေပြီး၊ ကမ္ဘာ့လျင်လှုပ်ရာအပိုင်းတွင်း၌ ကြရောက်နေရာ၊ လျင်မကြာခဏလှုပ်သည့် ဒေသတခု ဖြစ်လေသည်။ ဟိမဝန္တာတန်းခေါက်တောင်တန်း တောင်ဖြစ်မှုသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ် သန်းပေါင်း ၄၀ လောက်က စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာတွင် ယနေ့ထက်ထိဆုံးခန်းသို့ရောက်ရှိသေးခြင်းမရှိရာ၊ ယင်းတောင်ဖြစ်မှုနှင့် အကြီးဝင်သည့်ဒေသများသည် အခြေခိုင်မြဲမှုမရှိသေးဘဲ၊ မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏ ဒဏ်ကိုခံနေရဆဲ ဖြစ်နေသေး၏။

မြန်မာပြည်တွင် ကြီးကျယ်စွာလှုပ်ရှားခဲ့သည့် လျင်များကို ဖော်ပြထားသည့်မြေပုံကို ပုံ-၂၅ တွင် တင်ပြထားသည်။ ၁၈၃၅ခု မတ်လ ၂၃ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အလွန်ပြင်းထန်သည့် လျင်ကို အင်းဝလျင်ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ယင်းလျင်လှုပ်ရှားမှုကို ဗန်းမော်မှရန်ကုန်အထိ မြန်မာပြည်တပြည်လုံးနှင့် ယိုးဒယားပြည်အထိပါ ကျယ်ပြန့်စွာ ခံစားခဲ့ရသည်။ လျင်ကြီး၏ဒဏ်ကို အင်းဝနှင့်စစ်ကိုင်းမြို့များတို့သည် အကြီးကျယ်ဆုံးခံလိုက်ရသည်။ အဓိကလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးသည့်နောက်၊ တခြားပြင်းထန်သည့် လျင်များသည် ငါးမိနစ် သို့မဟုတ် မိနစ်နှစ်ဆယ်ခြားခန့် တနေ့လုံးဆက်ကာ လှုပ်ရှားခဲ့သေးသည်။ တချို့သောနောက်ဆက်တွဲလျင်များမလှုပ်ရှားမီ တစက္ကန့်မှ နှစ်စက္ကန့်ခန့်တွင်အမြောက်ပစ်သံကဲ့သို့သော အသံတခုသည်ကျယ်လောင်စွာ မြီးဟီးလေ့ရှိသည်။ တခြားသော နောက်ဆက်တွဲလျင်များသည် ပင်လယ်ရေလှိုင်းကြီးများအသွင်အရွေမှ အနောက်သို့ လှိုမ့်ဆင်းလာသကဲ့သို့ရှိသည်ဟု ဆို၏။ လျင်ကြီးလှုပ်ပြီးသည့်နောက် လေးငါးရက်အတွင်းများ၌လည်း၊ ၁၆ မိနစ်နှင့် ၂၀ မိနစ်ခြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယင်း လျင်ကြီးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဘုရားပုထိုးများ၊ တိုက်ကျောင်းများနှင့် အခြားအဆောက်အဦများ အများအပြား ပျက်စီးသည့်ပြင်၊ အသေအပျောက်လွန်စွာ များခဲ့သည်။ တချို့နေရာများ၌ မြေအက်ကွဲပြီး မြေအောက် ရေများ ပန်းထွက်ခဲ့ပြီး တချို့နေရာများရှိ ရေတွင်းများသည် ခန်းခြောက်ကုန်ကြသည်။

၁၈၄၃ နှင့် ၁၈၄၈ ခု နှစ်များ၌လည်း ကျောက်ဖြူမြို့၌ လျင်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်း၌ မီးတောင်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၁၈၅၈ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မြေလျင်သည်လည်း အမရပူရမြို့မှ သရက်မြို့နှင့် ပြည်မြို့များမှတဆင့် ရန်ကုန်နှင့် မော်လမြိုင်မြို့များအထိ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ၁၈၇၁ နှစ်တွင် မန္တလေးမြို့တွင် မပြင်းထန်လှသည့်လျင်လှုပ်မှုရှိပြီး၊ ၁၈၇၄ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၌ ပြင်းထန်သည့်လျင် လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့သည်။

၁၈၈၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့၌ ဘင်္ဂလားအော်မှ အစပြုပြီး လှုပ်ရှားခဲ့သည့် လျင်မှာ၊ အိန္ဒိယကျွန်းဆွယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေသများနှင့် အနွယ်ကျွန်းများအထိ ပြန့်ပွားသည့်အပြင်၊ မြန်မာ့ပင်လယ် ကမ်းတလျှောက် မြိတ်မြို့အထိ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။

မြန်မာပြည်၏ ၁၉၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ငလျင်မှာ အတော်ကြီးမားခဲ့သည်။ ယင်းငလျင်ကြောင့် မြောက်နှင့် တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မန္တလေး၊ မိုးကုတ်၊ ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်း၊ အောက်ချင်းတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်၊ မြင်းခြံ၊ မိတ္ထီလာ၊ မကွေး၊ ရမည်းသင်း၊ တောင်ငူနှင့် တောင်ငူနယ်များအပြင် ယိုးဒယားပြည် မြောက်ပိုင်းဒေသများသည် တုန်ခါသွားခဲ့သည်။

၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ပဲခူးငလျင်ကြီးကြောင့် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကြီး ချိုးယွင်း ပျက်စီးခဲ့သည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်အတွင်းတွင်လည်း ရန်ကုန်ကို ဗဟိုပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ငလျင်များသည် ဟံသာဝတီ၊ အင်းစိန်နှင့် သာယာဝတီနယ်များအထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။

၁၉၂၉ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့၌ တောင်ငူဒီစတြိတ်တွင်းရှိ ဆွာမြို့ကို ဗဟိုပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်သည့် မြေငလျင်သည် အတော်ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ယင်းငလျင်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ငလျင်များသည် ပဲခူးမြို့တွင်၎င်း၊ ဖြူးမြို့တွင်၎င်း ဗဟိုချက်ယူကာ ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။

ယင်း ၁၉၃၀ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်နေ့၌ ပဲခူးမြို့ကို ဗဟိုချက်ယူကာ လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ငလျင်ကြီးသည် လွန်စွာမှပင် ပြင်းထန်လေသည်။ ပဲခူးမြို့တွင် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၅၀၀ ခန့် သေဆုံး၍၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း အများအပြား သေကြေပျက်စီးခဲ့သည်။ ငလျင်လှုပ်ရှားမှုဒဏ်ကို ကျောက်ဖြူနှင့် မြိတ်ဒေသများ၊ မြောက်ဘက်တွင်မိုးမိတ်နှင့် အရှေ့ဘက်တွင်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ယိုးဒယားပြည်အထိ ခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။ ငလျင် ပြန့်ပွားမှု နေရာအကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၂၀,၀၀၀ ခန့်ရှိလေသည်။ လှုပ်ရှားမှု၏ အထောက်အထားကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မြေငလျင်တိုင်း ကရိယာများက တိုင်းထွာ မှတ်သားနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်၌ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း၌ ပြင်းထန်စွာ ငလျင်လှုပ်ရှားခဲ့သေးသည်။

အင်းဝ၊ မန္တလေး၊ အမရပူရ၊ ပျဉ်းမနား၊ ဆွာနှင့် ပဲခူးငလျင်များ၏ ငလျင်မြေပြင် ဗဟိုချက်များသည် မြောက်မှ တောင်အထိ တတန်းတည်း တည်ရှိနေသည်ကို သိရှိရသည် (ပုံ-၂၅)။ Boundary Fault) ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းပြတ်ရွှေ့ကြီးသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သန်းပေါင်းကြောင့် ပြတ်ရွှေ့ကြီး တည်ရှိသည့်လမ်းကြောင်း တလျှောက်တွင်၊ မြေငလျင်များ ပေါများစွာ လှုပ်ရှားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

၆။ တောင်တန်းကြီးများနှင့် တောင်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

တောင်တန်းကြီးများသည်၊ ကမ္ဘာကြီး၏ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာကြသည့် မြေပြင် လက္ခဏာများပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကို တောင်တန်းများဟု ခေါ်ဝေါ်သည့်အကြောင်းမှာ ယင်းတို့ သည် ပတ်ဝန်းကျင် မြေပြင်မှ ပေါ်ပေါင်း တစ်ခုကျော်မှ တောင်ပေါင်းများစွာအထိ မြင့်မောက်နေခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ယခုခေတ်ကမ္ဘာ့မြေပြင်၏ အသက်ရင့်ဆုံးသော ကျောက်များသည် တချိန်တွင်းက တချို့ သော ရှေးကြာသည့် တောင်တန်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်တွင် အသက်အကြီးရင့်ဆုံးသော တောင်တန်းများကို ဆူပီးရီးယားကန် (Lake superior) ကြီး၏ မြောက်ဘက်၌ တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းတောင်တန်းများ၏ ကျောက်များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်း ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ တောင်တန်းများ၏ မြေပြင်လက္ခဏာသည် အသက်ကြီးရင့် သည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘူမိသမိုင်းတလျှောက်တွင်၊ တောင်တန်းများသည် နေရာအနှံ့ အပြားသို့၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြရာ၊ ကမ္ဘာ့မြေပေါ်၌ တောင်တန်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ကင်းမဲ့သည့် ဒေသဟူ၍ပင် မရှိတော့ချေ။

ယခုအခါ ကမ္ဘာ့မြေပြင်၏ အနှံ့အပြားတို့တွင် မြင့်မားသည့် တောင်တန်းများသည် အများ အပြားပင် တည်ရှိနေကြပြီ။ ယင်းတို့သည် လျှောက်ချေမျှမျက်စီးခြင်းနှင့် ချောင်း၊ မြောင်း၊ ရေခဲမြစ် နှင့် လေဒက်တို့၏ တိုက်စားခြင်းကို ခံနေကြရသည်ကို တွေ့ရှိနေလေသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ပြင်ပ တိုက်စားချေဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် မြင့်မားသည့်တောင်တန်းများကို တဖြည်းဖြည်း ပြိုချပြီး မြေပြင်နှင့် ညီစေရန် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာအောင်ပင် အချိန်ယူ၍ လုပ်ဆောင် ကြသည်။ ထိုကြောင့်အားလုံးသော တောင်တန်းများသည်၊ နိမ့်ကြွလာပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကတည်းက ပင် မြေပြင်နှင့် တပြေးတည်း ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်တွေးထင်စရာပင် ဖြစ်သော်လည်း၊ ယခု ထက်တိုင် မြင့်မားသည့်တောင်တန်းများကို ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်၌ တွေ့နေရမည်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်း အချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပမြေပြင်လုပ်ငန်းများကို တန်ပြန်ထေမိခြင်းငှါ ကမ္ဘာ့တွင်းပိုင်းရှိ အင်အားများသည် တောင်တန်းများ၏ အမြင့်ကို ပြန်လည်မြင့်မားလာရန် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ဟု ယူဆရပေတော့မည်။

(က) တောင်တန်းကြီးများ တည်ရှိပုံ

တောင်တန်းကြီးများသည် ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများ၏ ထင်ရှားသော မြေပြင်လက္ခဏာများပင် ဖြစ်ကြသည် (ပုံ-၂၆)။ တိုက်ကြီးတခုခြင်းသည် ရှေးခေတ်နယ်မြေ၏ အလယ်ဗဟိုတခုစီဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သန်းပေါင်း ငါးဆယ်အတွင်းကစ၍ တည်ငြိမ်ကာ အခြေခိုင်မာခဲ့သော်လည်း၊ ယင်းတို့ ၏ အနားရိုးများသည် တည်ငြိမ်ခြင်းကင်းမဲ့ပြီး၊ တောင်များ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရာ ဒေသများ ဖြစ်ကြသည်။



သမုန်အားဖြင့်ကမ္ဘာ၏ကုန်းမြေ (ကုန်းမြေများအားလုံး၏ $\frac{2}{10}$ အစိတ်အပိုင်းမှအပ) ထုတိုသည် ရေထု၏ တဘက်တချက်တွင်ရှိသော ကမ္ဘာ၏ အခြမ်းတွင်တည်ရှိကြသည်။ သို့သော်လည်းအဆိုပါ ရေထုရှိသောအခြမ်းတွင် ရေအောက်၌မြုပ်နေသော တောင်တန်းများရှိနေကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိမူအပ်ပေသည်။

ဥပမာအားဖြင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်း၌ အလူးတီယန်ကျွန်း (Aleutian Islands) များသည် စက်ဝန်းအားဖြင့်မိုင်ပေါင်း ၁၄၅၀ ရှည်လျားပြီး ၆၂° ၄၀' မြောက်နှင့် ၁၇၀° ၂၀' အနောက်တို့ကို ဗဟိုပြုကာတည်ရှိနေကြသည်။ တခြားကျွန်းတန်းကွေးများသည်၊ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုများနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ကမ်းရိုးတန်း၏ ကျွန်းများပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကျွန်းတန်း၊ ကျွန်းကွေးများ၏ အပြင်ဘက်တွင် သမုဒ္ဒရာ၏ နက်ရှိုင်းသောချိုင့်များတည်ရှိကြသည်။

ဟာဝေယံမီးတောင်ကျွန်းများသည် မိုင်ပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်ရှည်လျားစွာ၊ အနောက်မြောက်အရပ်သို့ တန်းနေကြသည်။ ယင်းကျွန်းစုတန်းကို၊ မာကီစပ် (Marquesas)၊ ဆိုစိုင်းရာတီး (Society)၊ တူအာမိုဘူ (Tuamotu)၊ တူဘူအဲ (Tubuai) နှင့်စမိုးအာ (Samoa) ဟူသောကျွန်းဆက်များက ပြိုင်ကာနေကြသည်။

အိုက်စလန်မှအန္တာတစ်အထိ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအောက်ဘက်လည်း အတ္တလန္တိတ်ကုန်းတန်း (Atlantic Ridge, or Mid-Atlantic Ridge) ဟုတွင်သော ရေအောက်တောင်တန်းများတည်ရှိကြသည်။ ယင်းတို့သည်သမုဒ္ဒရာ၏ အလယ်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိကြပြီး၊ တိုက်ကြီးများ၏အနားစွန်းများနှင့် ပြိုင်နေကြကာ တချို့နေရာများ၌၊ ပင်လယ်အောက်ခြေမှ အမြင့်ပေ ၆၀၀၀ အထိ မြင့်တက်နေပြီး၊ တချို့နေရာများ၌၊ ပင်လယ်ရေ အောက်ပေပေါင်း ၉၀၀၀ ခန့် အနက်တွင် တည်ရှိနေကြသည်။ တချို့နေရာများ၌ ရေအောက် တောင်တန်းများ၏ တောင်ထိပ်များသည် အဇိုး (Azores)၊ စိန်ဟယ်လင်းနား (St. Helena) နှင့် တရစ်တန်ဒါကျွန်းဟား (Tristan da Cunha) ကဲ့သို့သောကျွန်းများအဖြစ် ရေပြင်ပေါ်သို့ ထိုးထွက်ပေါ်ထွန်းနေကြသည်။

အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်လည်း အလားတူ ရေအောက်ကုန်းတန်းများ ရှိကြသည်။ ယင်းတို့မှာ ကာဂူလင်-ဂေါ့ (၈) ဘတ်(ဂျီ)ကုန်းတန်း (Kerguelen-Gaussberg Ridge) နှင့်ကာ (၈) လဘတ် (ဂျီ) ကုန်းတန်း (Carlsberg) ကုန်းတန်းများဖြစ်ကြသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ကျွန်းကွေးများနှင့် ရေအောက်ကုန်းတန်းအားလုံးတို့သည်၊ ဟိမဝန္တာ၊ အပ် (၈) (Alps) နှင့်ရော့ကီးစသော တောင်တန်းများကဲ့သို့သော တောင်တန်းများပင် ဖြစ်ပေသည်။

(ခ) တောင်အမျိုးမျိုးများ


တောင်အမျိုးမျိုးများကိုတိကျစွာအဆင့်အတန်းခွဲခြားရန် အလွန်ခဲယဉ်းလေသည်။ ဖြစ်ပေါ်ပုံ အခြေခံခြင်းတူညီသည့် အချက်တစ်ခုပေါ် မူတည်၍ တောင် ၄ မျိုးခွဲခြားနိုင်လေသည်။ ယင်းတို့မှာ၊ တွန့်ခေါက်တောင် (fold mountains) ထုပြတ်ရွှေ့တောင် (fault-block mountains) မီးတောင် (volcanic mountains) နှင့် ကျယ်ပြန့်စွာမြင့်တက်နေသည့်တောင် (broadly upwarped mountains) များပင်ဖြစ်ကြသည် (ပုံ-၂၇)။

တွန့်ခေါက်တောင်တန်းများသည် အဓိကအားဖြင့် မြင့်တက်တွန့်ခေါက်နေသော အနည်ကျ ကျောက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ထုပြတ်ရွှေ့တောင်တန်းများတွင်၊ ပြတ်ရွှေ့များ အထူးပေါများပြီး၊ ကြီးမားသော ကျောက်ထုများသည် ထောင့်မြင့်သာမန် ပြတ်ရွှေ့များ ကာရံကာ မြင့်တက်နေကြသည်။ ယင်းကျောက်ထုများကို တည်ဆောက် ထားသော ကျောက်များသည် တွန့်ခေါက်လျက်သော်၎င်း၊ ညီညာစွာ အပြားလိုက် ထပ်လျက် သော်၎င်း တည်နေတတ်သည်။ မီးတောင်များသည် မြေအောက်မှ မြေပြင်သို့ ထိုးထွက်လာသော ချော်ကျောက်များနှင့် မီးတောင်ကျောက်စ ကျောက်နုများဖြင့် တည်ဆောက်ထားကြသည်။ အကယ်၍ ကျယ်ပြန့်စွာ တဖြည်းဖြည်း ခုံးတက်နေသည့် ကမ္ဘာ့မြေပြင်သည် အတော်အတန် မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး၊ ယင်း၏ ပေါ်ထွက်နေသည့် ကျောက်များသည်လည်း တိုက်စားခြင်းခံခဲ့ရသောကြောင့် တောင်တန်းများအသွင်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့သော်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မြေပြင်အနေအထားကို ကျယ်ပြန့်စွာ မြင့်တက်နေသည့် တောင်တန်းများဟု ခေါ်သည်။

(ဂ) တွန့်ခေါက်တောင်တန်းများ

တွန့်ခေါက် တောင်တန်းများသည်၊ တောင်တန်းများ အမျိုးမျိုးတွင် အပေါများဆုံးသော တောင်တန်းများဖြစ်သည်။ ရော့ကီ (၈) (Rokies) အပ် (၈) (Alps)၊ ဟိမဝန္တာ၊ ဂျူရာ (၈) (Juras) နှင့် ကာပသီရန်း (၈) (Carpathians)၊ စသည့် တောင်တန်းများသည် တွန့်ခေါက် တောင်တန်းများပင်ဖြစ်ကြသည်။ တွန့်ခေါက်တောင်တန်းများသည် မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာကြသည့် မြေပြင်အထောက်အထားများပင် ဖြစ်ကြသည်။ တွန့်ခေါက်တောင်တန်းများတွင် လွှာတွန့်ခုံးနှင့်လွှာ တွန့်ချိုင့်အမျိုးစုံတို့ပါဝင်ကြပြီး၊ တောင်တန်းများ၏အစွန်းများတွင် ပြတ်ရွှေ့များ ပိုမိုများပြားလေ့ ရှိကြသည်။ တချို့တွန့်ခေါက်တောင်များသည် လှိုင်းတွန့်များသဏ္ဌာန် ဖြစ်ပြီး အဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲ တည်ရှိနေတတ်သည်။ လွှာတွန့်ခုံးများ၏ ဘေးနားတွင်ရှိသော တချို့ ပြတ်ရွှေ့များသည် သာမန်ပြတ်ရွှေ့များ ဖြစ်ကြသည်။ ပြတ်ရွှေ့အများအပြားတို့သည် ထောင့်နိမ့် ပြတ်ရွှေ့လွန်များ ဖြစ်ကြသည်။

တွန့်ခေါက် တောင်တန်းများသည်၊ ထူထပ်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အနည်ကျ ကျောက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပေလီချန် တောင်တန်းများ (Appalachian mountains) သည်၊ ပေပေါင်း လေးသောင်းကျော် ထူသည့် အနည်ကျကျောက်များဖြင့် တည်ဆောက်



ပုံ-၂၇။ "တောင်အမျိုးမျိုး။" (က) တုန့်ပြည်မြို့၊ (ခ) တုန့်ချောင်းတောင်များ၊ (ဂ) ကျယ်ပြန့်စွာ မြင့်တက်နေသောတောင်များ၊ (ဃ) ကျယ်ပြန့်စွာ မြင့်တက်နေသောတောင်များ၊ (င) တုန့်ချောင်းတောင်များ၊ (စ) ရှပ်တေးတောင်များ (တိုက်စားခံရပြီး)။

ထားကြသည်။ ယင်းအနည်ကျကျောက်များသည် ပင်လယ်တွင်း၌ အလွှာလိုက် အနည်ကျပြီးမှ၊ ကမ္ဘာ့လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တွန့်ခေါက်လာပြီး၊ မြေပြင်ပေါ်သို့ မြင့်တက်လာခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာ့ကြီး၏ အခြားတွန့်ခေါက်တောင်များသည်လည်း အဆိုပါနည်းအတိုင်း အသီးသီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြသည်။ ရော့ကီးတောင်တန်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့် ကာလီဖိုးနီးယား ကမ်းခြေရှိ တွန့်ခေါက်တောင် တန်းများ၏ အနည်ကျကျောက်များ၏ အထူသည် ပေပေါင်းသုံးသောင်းခန့်ရှိပြီး၊ ဟိမဝန္တာတောင် တန်း၏ ပင်လယ်တွင်းဖြစ် အနည်ကျကျောက်၏အထူသည် များစွာပိုမိုပေမည်။

ကမ္ဘာ၏ အဓိက တောင်တန်းများသည် ဘူမိလွှာတွန့်ချိုင့်ကြီးများ (geosynclines) အတွင်း၌ တည်ရှိကြပြီး ထူထပ်စွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည့်အနည်ကျကျောက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထား ကြသည်။ ဘူမိလွှာတွန့်ချိုင့်ကြီးဆိုသည်မှာ၊ ကမ္ဘာ့မြေတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်သော ပင်လယ် ပတ်ဝန်းကျင်၌၊ ထူထပ်လှစွာသော အနည်ကျကျောက်များ အနည်ကျရာ ကြီးမားလှသည့်ရှည်မျော မျော ချိုင့်ကြီးကိုဆိုလိုသည်။

ဘူမိလွှာတွန့်ချိုင့်ကြီးများသည်၊ အများအားဖြင့် မိုင်ပေါင်းများစွာ ကျယ်ဝန်းပြီး၊ ရာပေါင်း များစွာသော မိုင်ခန့်ရှည်လျားကာ၊ ပေပေါင်းငါးသောင်းကျော်ထူသည့် အနည်ကျကျောက်များ၏ အနည်ကျ ရာဒေသများပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအနည်ကျကျောက်များ၏ ကျောက်သား၊ ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်းများ၊ လှိုင်းပုတ်ရာများနှင့် တခြားအထောက်အထားများကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် အနည် များဖြစ်ပေါ်သောဒေသသည် ရေနက်ပိုင်းဒေသမဟုတ်ဘဲ၊ အများအားဖြင့် ပေတထောင်အနက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည့် ရေတိမ်ပိုင်းဒေသဖြစ်သည်ဟု သိရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပေပေါင်းသောင်း နှင့်ချီပြီးထူထပ်သည့် အနည်ကျကျောက်များ ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိစေရန်၊ အနည်များ တဖြည်းဖြည်း ကျရောက်လာရာ ပင်လယ်ချိုင့်ဝှမ်း၏ အောက်ခြေသည် တဖြေးဖြေးနှင့် နိမ့်ဆင်းသွားကာ၊ ကမ္ဘာ့ မြေတွင်းသို့ ချိုင့်ဝင်သွားရမည်ဟု တွက်ချက်ရပေမည်။ သို့မှသာဘူမိလွှာတွန့်ချိုင့်ကြီးထဲ၌၊ လွန်စွာ ထူထပ်သော ပင်လယ်ရေတိမ်ဖြစ် အနည်ကျကျောက်များ ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပေမည်။


(ဃ) တောင်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ

ကမ္ဘာ၏ကျောက်လွှာများအား မြင့်တက်လာစေပြီး တောင်တန်းကြီးများ အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာ စေရန်၊ လွန်စွာကြီးမားသည့် အင်အားများကိုလိုပေမည်။ ယင်းကဲ့သို့သောအင်အားများ၏ အရင်းခံ ဖြစ်သော အောက်ဖော်ပြပါ အယူအဆသုံးခုကို တင်ပြထားပါသည်။

- (၁) အပူကျုံ့ခြင်းအယူအဆ (Thermal Contraction Theory)
- (၂) လှည့်ပတ်စီးကြောင်းအယူအဆ (Convection Current Theory)
- (၃) တိုက်ကြီးများရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသောအယူအဆ (Continental Drift Theory)


၁။ အပူကျုံ့ခြင်းအယူအဆ။ ။အပူကျုံ့ခြင်းအယူအဆကို ကမ္ဘာကြီးသည် ပူပြင်းသည့် အခြေအနေမှ တဖြည်းဖြည်းအေးလာသည့်အခါ အပူရှိန်သည်လည်း ပျယ်ပျောက်သွားသည်ဟူသော သဘောအပေါ်တွင် မူတည်၍ တွေးခေါ်ထားသည်။ အပူရှိန်ပျယ်ပျောက်သွားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီး၏တည်သေးငယ်လာကာ၊ ကမ္ဘာအပေါ်ရံ အလွှာသည်လည်း၊ ကျုံ့သွားသည့်ကမ္ဘာအတွင်းပိုင်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ရပေမည်။ ဤကဲ့သို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကိုပြုရာ၌၊ ကမ္ဘာအပေါ်ရံအလွှာသည်၊ ကျုံ့ပြီးတောင်တန်းကြီးများအား ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ဖော်ပြပါအပူကျုံ့ဝင်ခြင်း အယူအဆ၏ ယုံကြည်ချက်မှာ တောင်ဖြစ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့်အင်အားသည်၊ ကမ္ဘာကြီး၏ နဂိုရံမူလအပူရှိန်မှပေါ်ထွက်လာသည်ဟုပင်ယူဆထားသည်။ အချို့ဘူမိသိပ္ပံပညာရှင်များသည်၊ အပူကျုံ့ခြင်းအယူအဆကို ကန့်ကွက်ဝေဖန်ထားလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကမ္ဘာကြီးသည်ပူပြင်းသည့် အခြေအနေမှ အေးလာသည့်အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲလာရာ၌၊ ထွက်ပေါ်လာသည့် အပူချိန်သည်၊ တောင်များဖြစ်ပေါ်လောက်အောင် လုံလောက်သည့်အင်အားမရှိခြင်းနှင့် တောင်တန်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်ပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်နှင့် ဒေသတို့ကွာခြားခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

၂။ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းအယူအဆ။ ။ကမ္ဘာကြီးအတွင်း၌ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းများတည်ရှိနေခြင်းရှိသည်ဟူသော အတွေးအဆဖြင့်လည်း တောင်ဖြစ်ပေါ်ပုံကို ရှင်းပြနိုင်သေးသည်။ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းသည်၊ အမှုများ (particles) ရွေ့ရှားစေခြင်းဖြင့်၊ အပူရှိန်ကို တနေရာမှ တနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့် လုပ်ရပ် တခုပင် ဖြစ်သည်။ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်ပုံမှာ ရေအိုးတခုကို မီးပေါ်တွင်အပူပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အပူစီးကြောင်းများနှင့်တူသည် (ပုံ-၂၀) ။ အပူပေးလိုက်သည့်အခါ အိုး၏ အောက်ခြေတွင် ရှိသောရေသည် ပထမဦးဆုံး ပူလာခြင်းကြောင့်၊ ပေါ့ပါးလာကာ၊ အပေါ်သို့တဖြည်းဖြည်းတက်လာပေမည်။ ထိုအချိန်၌၊ နေရာယူလာသည့်ရေပူများကိုနေရာပေးရန်၊ အေးသည့်ရေများသည် အပေါ်မှ အောက်ခြေသို့ ပြန်သွားမည်။ ထိုသို့အတိုင်းသာ ဖြစ်သွားလျှင် မကြာမီပင်၊ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ယင်းစီးကြောင်းများသည် သာမန်အားဖြင့်အစုံလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်လေသည်။ အစုံတဘက်ကိုလှည့်ပတ်စီးကြောင်းဆဲ(လ်) (convection cell) တခုဟု ခေါ်သည်။



ပုံ - ၂၀။ ။လှည့်ပတ်စီးကြောင်း၏ ဥပမာပြသည့်ပုံ


အထက်ပါ အယူအဆအရ၊ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းများသည် ကမ္ဘာ၏ဗဟိုကို အခြေပြု၍၊ ကမ္ဘာ့ အလယ်လွှာ (mantle) တွင်း၌ လှည့်ပတ်စီးနေသည်ဟု ဘူမိဗေဒ သိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီးများက အဆိုပြုထားကြသည် (ပုံ - ၂၉)။ ကမ္ဘာ့အပေါ်ရံ ဝတ္ထုအစိုင်အခဲတို့သည် ရေကဲ့သို့ ပြုမူခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ယင်းတို့ကို လုံလောက်သည့် အင်အားဖြင့် ဖန်တည်းပေးလျှင် ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့ တဖြည်း



ပုံ - ၂၉။ ကမ္ဘာအတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော လှည့်ပတ်စီးကြောင်းများ

ဖြည်း ရွေ့ရှားတတ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်လွှာတွင်း၌ လှည့်ပတ်စီးကြောင်း များ စီးနေခြင်းဖြင့်၊ ကမ္ဘာ့အပေါ်ရံ အလွှာရှိ ဆီယာယ် (sial) ကျောက်တို့သည် ပလပ်စတစ် ကဲ့သို့ ရွေ့ရှားလျက် အလယ်လွှာအတွင်းထဲသို့ ချိတ်ဝင်သွားကာ ဘူမိလွှာတုန်ချိုင့်ကြီးများ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဘေးနှစ်ဘက်တို့မှ တုန်းအားများလည်း ပေါ်ပေါက် လာခြင်းကြောင့် တုန်ခေါက် တောင်တန်းကြီးများ ဖြစ်လာကြပေသည် (ပုံ - ၃၀)။

လှည့်ပတ်စီးကြောင်းများကို အခြေခံပြု၍၊ တောင်ဖြစ်ခြင်းဟူသော အယူအဆကို တချို့သော ဘူမိသိပ္ပံရှင်များက ကန့်ကွက်ထားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ယင်းအယူအဆသည်၊ ကမ္ဘာ၏ တောင်တန်းများ ပျံ့နှံ့တည်ရှိပုံ အတိအကျနှင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အချိန်ခန့်မှန်းခြေတို့ကို ရှင်းပြခြင်း မပြုနိုင်သောကြောင့်တည်း။



ပုံ - ၃၀။ ။ဂရိဂ် (Grigg) ၏ တောင်ဖြစ်ခြင်း အယူအဆ။

(က) ယလ်တစ်အလွှာ၌လှည့်ပတ်စီးကြောင်း ၂-ခုကြောင့် နိမ့်ကျချိုင့်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အလွှာအောက်ခြေ၌ တောင်၏ အခြေခံ အမြစ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ပြထားသည့်ပုံ။

(ခ) မှ (သ)။ လှည့်ပတ်စီးကြောင်းအယူအဆအရ၊ တောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုပြသည့် ဖြတ်ပိုင်းပုံများ။

၃။ တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆ။ ။အစနိုက်ဒါ (A. Snider) နှင့် အေဝဲဂျီ (A. Wegener) တို့သည် တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ယင်းအဆိုအရ၊ တချိန်က ယခုလက်ရှိ တိုက်ကြီးများသည်၊ တစုတပေါင်းတည်း တည်ရှိနေကာ၊ တခုတည်းသော ကြီးမားလှသည့် တိုက်ကြီးတခုအနေနှင့်သာ တည်ရှိခဲ့သည်။ နောင် သောအခါကြမှ၊ ကမ္ဘာ၏လွှပ်ရှားမှုများကြောင့် အဆိုပါတိုက်ကြီးသည် အစိတ်စိတ်အမှီအမှိုက်ကွဲကာ၊ နေရာအနှံ့အပြားတို့သို့ တဖြည်းဖြည်း ရွေ့လျားခဲ့ရာမှ၊ ယခုခေတ်ရှိ တိုက်ကြီးများအဖြစ် တည်ရှိလာ ကြသည်ဟု ယူဆကြသည်။ တိုက်ကြီးများရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆကို၊ အပိုင်း (ဂ) တွင် ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။

အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ တိုက်ကြီးများတဖြည်းဖြည်း ရွေ့လျားခြင်းကြောင့် အင်အားများ ပေါ်ပေါက်လာကာ၊ တိုက်ကြီးများ၏ အစွန်းများနှင့်၊ ကျွန်းကျွန်းများ၌ တောင်တန်း များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ တိုက်ကြီးများ၏ အစွန်းများတွင် တည်ရှိကြသော တောင်အမေရိကတိုက်၏ အန်းဒီးစ် (Andes)၊ မြောက်အမေရိကတိုက်၏ ရော့ကီးစ် (Rockies) တောင်တန်းများနှင့် အယ်လပိုင်စ်-ဟိမဝန္တာတောင်တန်းများ ပေါ်ပေါက်လာပုံသည်၊ အထက်ဖော်ပြ ပါ အယူအဆအရ အငြင်းပွားစရာ မရှိပေ။ သို့သော်လည်း အပလေချီယန်းကဲ့သို့သော တောင်တန်း များနှင့်တကွ၊ တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားခဲ့မှုမဖြစ်မီ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော တောင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကား၊ တိုက်ကြီးများ ရွေ့လျားခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆသည် ရှင်းလင်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိပေ။

ထို့ကြောင့် ယခုလောလောဆယ် အခြေအနေအားဖြင့်၊ တောင်များဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်း အစစ်အမှန်ကို တင်ပြနိုင်ခြင်းငှါ မတတ်နိုင်သေးချေ။

၇။ မီးတောင်များနှင့် မီးတောင်ဖြစ်မှု

ဘူမိသမိုင်း တလျှောက်တွင်၊ ကမ္ဘာ့အပေါ်ရံမြေတွင်း၌ ကျောက်စိုင် ကျောက်ထုတို့သည် မကြာခဏ ဆိုသလိုပင်၊ အရည်ပျော်ခဲ့ကြသည်ကို သိရှိရလေသည်။ တချို့သော အရည်ပျော်ခဲ့သည့် ကျောက်များသည်၊ လမ်းကြောင်းရှာဖွေကာ၊ ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်သို့ အေးဆေးငြိမ်သက်စွာ တက် လာပြီး အေးခဲသွားခဲ့သော်လည်း၊ တချို့ကျောက်ရည်ပူတို့သည်၊ ကမ္ဘာ့မြေပြင်ကို အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် ထိုးဖောက်ကာ၊ ပေါက်ကွဲပြီးမှသာ အေးခဲပြီးကျောက်အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ မီးတောင်ဖြစ်မှုသည် မီးသင့်လှုပ်ရှားမှု (igneous activity) တရပ်ပင်ဖြစ်သည်။

(က) အက်ကွဲကြောင်းနှင့် ဗဟိုပေါက်ကွဲမှုများ (Fissure and Central Eruptions)

မီးတောင်ဆိုသည်မှာ ကျောက်ရည်ပူ (magma) တို့ ထိုးထွက်ရာ၊ ကမ္ဘာ့မြေပြင်၌ ဖြစ်ပေါ် နေသည့် ပြွန်ပေါက်ပင်ဖြစ်သည်။ မီးတောင်သည်ထပ်ခါတလဲလဲ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သောအခါ၊ ချော်များ နှင့် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကျောက်များသည် ပြွန်ပေါက် ပတ်ပတ်လည်၌ စုပုံနေပြီး